

植株高(10—)20—55厘米。根状茎横走,粗0.6—1厘米,节间缩短。基生叶(0—)1(—3),有长柄;叶片心状五角形,长(2—)6—10厘米,宽(4—)7—18厘米,三全裂,全裂片有短柄或无柄,中全裂片菱形,三深裂,边缘有不规则小裂片或粗齿,侧全裂片不等二深裂,两面疏被短毛;叶柄长13—37厘米,无毛或上部有疏毛。花葶直立;苞片3,有柄(柄长1.4—3.5厘米),叶片似基生叶,长达10厘米;花梗1—3,长(2.5—)5—17厘米,有短柔毛;萼片5,白色,倒卵形,长1—2(—3.8)厘米,宽0.6—1.3(—2.1)厘米,背面有疏柔毛;雄蕊长约为萼片长度的 $\frac{1}{4}$,花药狭椭圆形,花丝丝形;心皮45—70,无毛,有稍向外弯的短花柱,柱头小,近球形。瘦果卵球形,稍扁,长约2.5毫米,顶端有不明显的短宿存花柱。5月至6月开花。

分布于西藏东部(墨脱,海拔2300米)、云南西北部(大理以北,2500—3500米)、四川(1700—2700米)、贵州(凯里,950米)、湖南西北部(桑植)、湖北西部。生山地沟谷杂木林或竹林中或沟边较阴处,常生石上。模式标本采自四川宝兴。

根状茎可供药用,治跌打损伤等症(四川,峨眉山)。

2. 糙叶银莲花 图版 1:4

Anemone scabriuscula W. T. Wang, 植物分类学报 12: 160. 1974.


植株高4.5—6厘米。根状茎垂直或稍斜,圆柱状,粗约8毫米,密生纤维状细根。基生叶2—4,有长柄;叶片五角状卵形,长2.2—6.5厘米,宽3—6.5厘米,基部心形,三全裂,中全裂片近无柄,菱形,顶端锐渐尖,基部楔形,三浅裂,浅裂片边缘有缺刻状锯齿,侧全裂片无柄,斜扇形,不等二深裂,两面有短糙伏毛,有小蜂窝状凹点,稍粗糙;叶柄长3.5—9.5厘米,有疏短硬毛或近无毛。花葶直立;苞片3,有柄(长5—10毫米),叶片似基生叶,长1.2—3.4厘米,全裂片通常长渐尖;花梗1,长约1.7厘米,密被近贴伏的白糙毛;萼片5,白色,倒卵形,长5—6毫米,宽3—3.5毫米,顶端圆形,外面有短柔毛;雄蕊长约3毫米,花药椭圆形,长约0.8毫米,顶端有短尖;心皮约14,长约2.5毫米,无毛,花柱短。9月开花。

产云南西北部(巨甸)。生海拔2900米一带山地疏林下。

3. 匍枝银莲花(东北草本植物志)

Anemone stolonifera Maxim. in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb. 22: 225. 1876; 东北草本植物志 3: 154. 1974. — *A. siuzevi* Kom. in Act. Hort. Petrop. 25: 814. 1907.

植株高15—25厘米。匍匐茎横行,铁丝状,粗约0.4毫米,节间长约1厘米。基生叶1至数个,有长柄;叶片肾形或肾状五角形,长2—2.5厘米,宽2.8—4厘米,三全裂,中全裂片菱形或宽菱形,基部楔形突缩成短柄,三深裂,深裂片二或三裂,末回裂片卵形或狭卵形,侧全裂片近无柄,不等二深裂,表面有疏柔毛,背面毛较密;叶柄长8—11厘米,只在上部被短毛。花葶上部有稍密的短柔毛;苞片3,有柄,菱状卵形,长约2.5厘米,三全裂,分



1—3 西南银莲花 *Anemone davidii* 1. 植株外形；2. 雄蕊；3. 心皮。4. 糙叶银莲花 *A. scabriuscula* 植株外形。5—8. 小银莲花 *A. exigua* 5. 植株外形；6. 花；7. 雄蕊；8. 心皮。（赵宝恒绘）