

植株高(10—)20—55厘米。根状茎横走,粗0.6—1厘米,节间缩短。基生叶(0—)1(—3),有长柄;叶片心状五角形,长(2—)6—10厘米,宽(4—)7—18厘米,三全裂,全裂片有短柄或无柄,中全裂片菱形,三深裂,边缘有不规则小裂片或粗齿,侧全裂片不等二深裂,两面疏被短毛;叶柄长13—37厘米,无毛或上部有疏毛。花葶直立;苞片3,有柄(柄长1.4—3.5厘米),叶片似基生叶,长达10厘米;花梗1—3,长(2.5—)5—17厘米,有短柔毛;萼片5,白色,倒卵形,长1—2(—3.8)厘米,宽0.6—1.3(—2.1)厘米,背面有疏柔毛;雄蕊长约为萼片长度的 $1/4$,花药狭椭圆形,花丝丝形;心皮45—70,无毛,有稍向外弯的短花柱,柱头小,近球形。瘦果卵球形,稍扁,长约2.5毫米,顶端有不明显的短宿存花柱。5月至6月开花。

分布于西藏东部(墨脱,海拔2300米)、云南西北部(大理以北,2500—3500米)、四川(1700—2700米)、贵州(凯里,950米)、湖南西北部(桑植)、湖北西部。生山地沟谷杂木林或竹林中或沟边较阴处,常生石上。模式标本采自四川宝兴。

根状茎可供药用,治跌打损伤等症(四川,峨眉山)。

2. 糙叶银莲花 图版 1:4

Anemone scabriuscula W. T. Wang, 植物分类学报 12: 160. 1974.

植株高4.5—6厘米。根状茎垂直或稍斜,圆柱状,粗约8毫米,密生纤维状细根。基生叶2—4,有长柄;叶片五角状卵形,长2.2—6.5厘米,宽3—6.5厘米,基部心形,三全裂,中全裂片近无柄,菱形,顶端锐渐尖,基部楔形,三浅裂,浅裂片边缘有缺刻状锯齿,侧全裂片无柄,斜扇形,不等二深裂,两面有短糙伏毛,有小蜂窝状凹点,稍粗糙;叶柄长3.5—9.5厘米,有疏短硬毛或近无毛。花葶直立;苞片3,有柄(长5—10毫米),叶片似基生叶,长1.2—3.4厘米,全裂片通常长渐尖;花梗1,长约1.7厘米,密被近贴伏的白糙毛;萼片5,白色,倒卵形,长5—6毫米,宽3—3.5毫米,顶端圆形,外面有短柔毛;雄蕊长约3毫米,花药椭圆形,长约0.8毫米,顶端有短尖;心皮约14,长约2.5毫米,无毛,花柱短。9月开花。

产云南西北部(巨甸)。生海拔2900米一带山地疏林下。

3. 匍枝银莲花(东北草本植物志)

Anemone stolonifera Maxim. in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb. 22: 225. 1876; 东北草本植物志 3: 154. 1974. — *A. siuzevi* Kom. in Act. Hort. Petrop. 25: 814. 1907.

植株高15—25厘米。匍匐茎横行,铁丝状,粗约0.4毫米,节间长约1厘米。基生叶1至数个,有长柄;叶片肾形或肾状五角形,长2—2.5厘米,宽2.8—4厘米,三全裂,中全裂片菱形或宽菱形,基部楔形突缩成短柄,三深裂,深裂片二或三裂,末回裂片卵形或狭卵形,侧全裂片近无柄,不等二深裂,表面有疏柔毛,背面毛较密;叶柄长8—11厘米,只在上部被短毛。花葶上部有稍密的短柔毛;苞片3,有柄,菱状卵形,长约2.5厘米,三全裂,分

裂情况似基生叶，柄长0.7—2厘米，有短柔毛；花梗2，长2—5厘米；萼片5，白色，椭圆形或椭圆状卵形，长7—10毫米，宽4—6毫米，外面有疏柔毛；雄蕊长2—3.5毫米，花药椭圆形，长约0.6毫米，花丝丝形；心皮约8，子房有稀疏短柔毛，花柱短，顶端稍向外弯。6月开花。

在我国分布于黑龙江东部、台湾。生山地阔叶林下。在朝鲜、日本也有分布。

《东北草本植物志》第3卷，图版65有匍枝银莲花的图，可以参考。

4. 小银莲花(中国高等植物图鉴) 图版1: 5—8

Anemone exigua Maxim. in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb. 23: 306. 1877; Fl. Tang. 9, t. 2, f. 7—15. 1889; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 314. 1931; 秦岭植物志 1(2): 278, 图239. 1974.

植株高5—24厘米。根状茎斜，细长，粗约0.5毫米，节间长0.8—1厘米。基生叶2—5，有长柄；叶片心状五角形，长1—3厘米，宽1.7—4厘米，三全裂，中全裂片有短柄，宽菱形，顶端钝，三浅裂，边缘在中部以上有少数钝牙齿，侧全裂片稍小，不等二浅裂，两面有疏柔毛；叶柄长3.5—13厘米。花萼1(—2)，上部有疏柔毛；苞片3，有柄(长3.5—15毫米)，叶片三角状卵形或卵形，长0.7—1.6厘米，宽0.8—3厘米，三深裂；花梗1—4，长1—3厘米，有柔毛；萼片5，白色，椭圆形或倒卵形，长5.5—9.5毫米，宽2—5.5毫米，外面有短柔毛；雄蕊长为萼片之半，花药椭圆形，花丝丝形；心皮5—8(—10)，子房有短疏毛，花柱短。瘦果黑色，近椭圆球形，长约2.6毫米，疏被短毛。6月至8月开花。

分布于云南西北部(丽江，海拔3500米)、四川西部、青海东部(2000—2960米)、甘肃南部、陕西(太白山)、山西南部(灵石，2100米)。生山地云杉林中或灌丛中。模式标本采自青海大通。

5. 台湾银莲花

Anemone takasagomontana Masamune in Lecomte, Not. Syst. 6: 37. 1937.

植株高约6厘米，被疏柔毛。基生叶2—3，有长柄；叶片膜质，三角状圆形，三裂，中全裂片卵状菱形，三深裂，边缘有浅锯齿，侧全裂片有极短的柄，具2小浅裂片，小裂片有浅锯齿；叶柄长约3厘米。花萼高约6厘米；苞片3，有柄，叶片三深裂，边缘有浅锯齿，叶柄基部有鞘；花梗1—3，长4—6厘米；萼片5，白色，长圆形，长约5毫米，顶端圆形；花药长圆形，长约1毫米，顶端圆形，花丝丝形；心皮镰刀状卵形，有疏柔毛，花柱短，圆锥形，顶端向外弯。7月开花。

产我国台湾。

6. 三出银莲花 图版13: 9—11

Anemone griffithii Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 21. 1855; Brühl in Ann. Bot. Gard. Calc. 5: 75, t. 105A. 1896. — *A. nanohuanensis* W. T. Wang,