

裂情况似基生叶，柄长0.7—2厘米，有短柔毛；花梗2，长2—5厘米；萼片5，白色，椭圆形或椭圆状卵形，长7—10毫米，宽4—6毫米，外面有疏柔毛；雄蕊长2—3.5毫米，花药椭圆形，长约0.6毫米，花丝丝形；心皮约8，子房有稀疏短柔毛，花柱短，顶端稍向外弯。6月开花。

在我国分布于黑龙江东部、台湾。生山地阔叶林下。在朝鲜、日本也有分布。

《东北草本植物志》第3卷，图版65有匍枝银莲花的图，可以参考。

4. 小银莲花(中国高等植物图鉴) 图版1: 5—8

Anemone exigua Maxim. in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb. 23: 306. 1877; Fl. Tang. 9, t. 2, f. 7—15. 1889; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 314. 1931; 秦岭植物志 1(2): 278, 图239. 1974.

植株高5—24厘米。根状茎斜，细长，粗约0.5毫米，节间长0.8—1厘米。基生叶2—5，有长柄；叶片心状五角形，长1—3厘米，宽1.7—4厘米，三全裂，中全裂片有短柄，宽菱形，顶端钝，三浅裂，边缘在中部以上有少数钝牙齿，侧全裂片稍小，不等二浅裂，两面有疏柔毛；叶柄长3.5—13厘米。花萼1(—2)，上部有疏柔毛；苞片3，有柄(长3.5—15毫米)，叶片三角状卵形或卵形，长0.7—1.6厘米，宽0.8—3厘米，三深裂；花梗1—4，长1—3厘米，有柔毛；萼片5，白色，椭圆形或倒卵形，长5.5—9.5毫米，宽2—5.5毫米，外面有短柔毛；雄蕊长为萼片之半，花药椭圆形，花丝丝形；心皮5—8(—10)，子房有短疏毛，花柱短。瘦果黑色，近椭圆球形，长约2.6毫米，疏被短毛。6月至8月开花。

分布于云南西北部(丽江，海拔3500米)、四川西部、青海东部(2000—2960米)、甘肃南部、陕西(太白山)、山西南部(灵石，2100米)。生山地云杉林中或灌丛中。模式标本采自青海大通。

5. 台湾银莲花

Anemone takasagomontana Masamune in Lecomte, Not. Syst. 6: 37. 1937.

植株高约6厘米，被疏柔毛。基生叶2—3，有长柄；叶片膜质，三角状圆形，三裂，中全裂片卵状菱形，三深裂，边缘有浅锯齿，侧全裂片有极短的柄，具2小浅裂片，小裂片有浅锯齿；叶柄长约3厘米。花萼高约6厘米；苞片3，有柄，叶片三深裂，边缘有浅锯齿，叶柄基部有鞘；花梗1—3，长4—6厘米；萼片5，白色，长圆形，长约5毫米，顶端圆形；花药长圆形，长约1毫米，顶端圆形，花丝丝形；心皮镰刀状卵形，有疏柔毛，花柱短，圆锥形，顶端向外弯。7月开花。

产我国台湾。

6. 三出银莲花 图版13: 9—11

Anemone griffithii Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 21. 1855; Brühl in Ann. Bot. Gard. Calc. 5: 75, t. 105A. 1896. — *A. nanohuanensis* W. T. Wang,