

植物分类学报 12: 161. 1974.

植株高 5.5—20 厘米。根状茎长 0.8—2 厘米，粗约 4 毫米，节间短，节密集。基生叶 2(—3)，为三出复叶，有长柄；叶片长 1.4—3 厘米，宽 1.8—3.8 厘米，小叶有细柄(长 3—7 毫米)，中央小叶菱形或菱状卵形，长达 2.4 厘米，顶端钝，三裂，边缘有圆齿，两面有少数短伏毛，侧生小叶斜扇形，不等二深裂；叶柄长 3—8 厘米，近无毛。花葶直立，在顶部有稀疏柔毛；苞片 3，长 1.7—4.5 厘米，宽 1.3—4 厘米，有柄(长 3—10 毫米)，三全裂，中全裂片有短柄，菱形，在中部三裂，边缘有圆齿和小裂片，侧全裂片较小，不等二裂；花梗 1(—2)，长 1.7—3.8 厘米，密被短柔毛；萼片 5，白色，倒卵形或狭倒卵形，长 4—8 毫米，宽 3.5—6 毫米，外面有疏柔毛；雄蕊长 3—6 毫米，花药椭圆形，长 0.8—1 毫米，花丝丝形；心皮 8—30，无毛，子房卵形，近无花柱，柱头小，近球形。5 月至 6 月开花。

在我国分布于西藏南部、四川(灌县、南川)。生海拔 1650—3000 米间山地林下或沟边。在不丹、锡金、尼泊尔也有分布。

7. 阿尔泰银莲花(中药志) 九节菖蒲、玄参(陕西)，穿骨七(湖北) 图版 2: 4—6

Anemone altaica Fisch. ex C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. 2: 362. 1830; Ulbr. in Bot. Jahrb. 37: 222. 1906; 秦岭植物志 1(2): 279, 图 240. 1974.

植株高 11—23 厘米。根状茎横走或稍斜，粗约 4 毫米，节间长 3—5 毫米。基生叶 1 或不存在，有长柄；叶片薄草质，宽卵形，长 2—4 厘米，宽 2.6—7 厘米，三全裂，中全裂片有细柄，又三裂，边缘有缺刻状牙齿，侧全裂片不等二全裂，两面近无毛；叶柄长 4—10 厘米，无毛。花葶近无毛；苞片 3，有柄(长 0.5—1.8 厘米)，叶片宽菱形或宽卵形，长 2.4—6.5 厘米，宽 2.5—7.5 厘米，基部浅心形，三全裂，中全裂片狭菱形，三浅裂，中部以上边缘有不整齐锯齿，侧全裂片二浅裂；花梗 1，长 2.5—4 厘米，有近贴伏的柔毛；萼片 8—9，白色，倒卵状长圆形或长圆形，长 1.5—2 厘米，宽 3.5—7 毫米，顶端圆形，无毛；雄蕊长 5—6 毫米，花药长约 1 毫米，花丝近丝形；心皮 20—30，子房密被柔毛，花柱短，柱头小。瘦果卵球形，长约 4 毫米，有柔毛。3 月至 5 月开花。

在我国分布于湖北西北部、河南西部、陕西南部、山西南部。生海拔 1200—1800 米间山地谷中林下，灌丛中或沟边。在欧洲、亚洲北部广布。

根状茎药用，治癫痫、神经衰弱、风湿关节痛等症(陕西中草药)。

8. 多被银莲花(东北植物检索表) 两头尖(东北)，老鼠屎(山东东北部) 图版 2: 1—3

Anemone raddeana Regel in Bull. Soc. Nat. Mosc. 34: 16. 1861; Ulbr. in Bot. Jahrb. 37: 220. 1906; 东北草本植物志 3: 152. 1975.

植株高 10—30 厘米。根状茎横走，圆柱形，长 2—3 厘米，粗 3—7 毫米。基生叶 1，有长柄，长 5—15 厘米；叶片三全裂，全裂片有细柄，三或二深裂，变无毛；叶柄长 2—7.8 厘米，有疏柔毛。花葶近无毛；苞片 3，有柄(长 2—5 毫米)，叶片近扇形，长 1—2 厘米，三



1—3. 多被银莲花 *Anemone raddeana* 1. 植株上部; 2. 雄蕊; 3. 心皮。4—6. 阿尔泰银莲花 *A. altaica* 4. 植株全形; 5. 雄蕊; 6. 心皮。7—9. 黑水银莲花 *A. amurensis* 7. 植株全形; 8. 雄蕊; 9. 心皮。10—12. 阴地银莲花 *A. umbrosa* 10. 植株上部; 11. 雄蕊; 12. 心皮。13—15. 乌德银莲花 *A. udensis* 13. 植株上部; 14. 雄蕊; 15. 心皮。16—18. 反萼银莲花 *A. reflexa* 16. 根状茎和植株上部; 17. 雄蕊; 18. 心皮。(赵宝恒绘)