

在我国分布于云南西北部(海拔 3000 米)、四川(1700 米)、贵州(1100—1800 米)、湖北西部、湖南、江西、浙江西北部、江苏南部、陕西南部(1100—1200 米)、甘肃南部(达 2600 米)。生山地谷中草地或林下。在日本和苏联远东地区也有分布。

根状茎可药用,治跌打损伤(浙江天目山药用植物志)。

14b. 展毛鹅掌草(变种)

Anemone flaccida var. *hirtella* W. T. Wang in Addenda.

与鹅掌草的区别:叶片较厚,草质,脉在背面隆起;叶柄和花萼密被开展的微硬毛;花序有 5 花。

产湖北利川。生海拔 1000 米一带山地沟边。

14c. 裂苞鹅掌草(变种)

Anemone flaccida var. *hofengensis* Wuzhi, 湖北植物志 1: 352, 图 491. 1977.

与鹅掌草的区别:叶片较厚,草质,脉在背面隆起;花序有 (4—)5—6 花;苞片深裂,裂片多少细裂。植株常较高大,高达 63 厘米;基生叶长达 6.2 厘米,宽达 12 厘米。叶柄和花萼只在上部疏被短柔毛。

分布于湖南西北部(桑植)、湖北西南部(恩施、合丰)、四川东部(奉节)。生海拔 1200—1400 米间山地沟边或草坡。

15. 川西银莲花 图版 3: 7—10


Anemone prattii Huth ex Ulbr. in Bot. Jahrb. 36, Beibl. 80: 4. 1905; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 175. 1939.

植株高 11—30 厘米。根状茎近圆柱形,粗 5—7 毫米,节间缩短,有时自顶部生出陆生的细长走茎。基生叶 1—2(—3),有长柄;叶片心状五角形,长 3—3.6 厘米,宽 4.8—5.5 厘米,三全裂,中全裂片菱形,基部楔形并全缘,在中部三裂近中脉,二回裂片近羽状分裂,末回裂片宽披针形、狭卵形或卵形,侧全裂片斜扇形,二深裂,表面疏被短柔毛,背面近无毛,叶柄长 5—16 厘米,无毛。花萼只上部有疏柔毛;苞片 3,无柄,不等大,宽菱形至狭菱形,三裂至或超过中部;花梗 1—2,长 3.6—7.7 厘米,有短柔毛;萼片 5,白色,椭圆状倒卵形或椭圆形,长 8—10 毫米,宽 3.5—6.5 毫米,顶端圆形;雄蕊长约为萼片之半,花药椭圆形,长约 0.8 毫米,花丝丝形;心皮 4—7,子房密被短柔毛,柱头近球形,无柄。4 月至 5 月开花。

分布于云南北部(茨开、巧家)、四川西部。生海拔 1700—2400 米间山地林下阴湿处。模式标本采自四川康定。

16. 细茎银莲花 图版 16: 5

Anemone rossii S. Moore in Journ. Linn. Soc. Bot. 17: 376, t. 16, f. 1—2. 1879; Kom. in Act. Hort. Petrop. 22: 264. 1903; 东北草本植物志 3: 154. 1975. —*A. baicalensis* ssp. *glabrata* var. *rossii* (S. Moore) Kitag. in Rep. Inst.



1—3. 鹅掌草 *Anemone flaccida* 1.植株; 2.雄蕊; 3.心皮。4—6. 短柱银莲花 *A. brevistyla* 4.植株; 5.雄蕊×6; 6.心皮。7—10. 川西银莲花 *A. prattii* 7.根状茎和基生叶; 8.基生叶×1; 9.雄蕊; 10.心皮。(赵宝恒绘)