

Sci. Res. Mansh. 4(7): 81. 1940.

植株高 10—30 厘米。根状茎圆柱形，长约 2.5 厘米，粗 3—4 毫米，节间长约 2 毫米。基生叶 1，有长柄；叶片圆肾形，长约 1.8 厘米，宽约 3.5 厘米，三全裂，中全裂片菱状倒卵形，三裂至中部附近，二回裂片有线形小裂片，侧全裂片不等二深裂，表面有稀疏伏毛，背面无毛；叶柄长 8—20 厘米。花萼上部疏被柔毛或近无毛；苞片 3，无柄，似基生叶，长 1.1—1.7 厘米；花梗 1，长 0.7—6 厘米，疏被短柔毛；萼片 5(—7)，白色，狭倒卵形，长 8—12 毫米，宽 4—6.5 毫米，无毛或外面有疏柔毛；雄蕊长达 3 毫米，花药狭椭圆形，长 1 毫米，花丝狭线形；心皮 7—8，子房密被白色柔毛，花柱近不存在，柱头陀螺形。5 月至 6 月开花。

在我国分布于辽宁(凤城)、吉林(桦甸、安图)。生山地林下。在朝鲜北部也有分布。

17. 红叶银莲花

Anemone erythrophylla Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. 53: 125. 1906. — *A. wilsonii* Hemsl. in Kew Bull. 1906: 149. 1906, non Ulbr., 1905.

植株高 7—15 厘米。根状茎短，有鳞片，下部生出细长的走茎。基生叶 2，有长柄；叶片五角形或圆肾形，长 1.6—2.2 厘米，宽 2.2—4.5 厘米，基部心形，三裂至中部，一回中裂片较小，宽菱状倒卵形，上部边缘有小裂片和圆牙齿，一回侧裂片较大，斜扇形，表面绿色，背面红紫色，两面疏被淡黄色短毛；叶柄长 1.8—11 厘米，有开展的淡黄色柔毛。花萼有开展的柔毛；苞片 3，无柄，稍不等大，长 0.4—1.1 厘米，菱形或宽菱形，三裂或不分裂；花梗 1，长 3—5 厘米，有短柔毛；萼片 6—8，白色，倒卵形，长约 1 厘米，宽 4—5 毫米，顶端圆形或钝，外面有柔毛；雄蕊长不到萼片长度的 1/3，花药圆形，花丝丝形；心皮约 10，卵球形，子房密被短毛，柱头头形，近无柄。5 月开花。

产四川西部。生海拔 2100—2700 米间山地阴湿处。

18. 芹叶银莲花

Anemone saniculiformis C. Y. Wu ex W. T. Wang, 植物分类学报 12: 164. 1974.

植株高 (10—)14—30 厘米。根状茎细，粗 1.2—2 毫米，节间长 0.8—2 厘米。基生叶 2(—3)，有长柄；叶片肾状五角形，长 2.6—5.8 厘米，宽 5—10 厘米，基部深心形，三全裂，中全裂片菱状倒卵形，不明显三浅裂，侧浅裂片不明显二裂，中浅裂片不分裂，边缘有圆牙齿，侧全裂片斜扇形，不等二浅裂或二裂稍超过中部，两面沿脉疏被柔毛；叶柄长 (3—)10—22 厘米，有疏柔毛，基部有狭鞘。花萼有疏柔毛；苞片 3，无柄，不等大，最大的宽菱形，长 2—3.7 厘米，三裂近中部，中等大的菱形或菱状倒卵形，长 1.5—3.2 厘米，三浅裂，最小的椭圆形，长 1.2—2.8 厘米，三浅裂至全缘；花梗 1—2，长 3.5—8 厘米，有疏柔毛；萼片 5(—7)，白色，倒卵形或狭倒卵形，长 0.8—1.8 厘米，宽 5—8 毫米，外面有疏