

植株高 28—38 厘米。根状茎稍斜，上部粗约 5 毫米。基生叶 3，有长柄；叶片心状圆形或肾形，长 1.8—3.5 厘米，宽 2.6—6.5 厘米，三全裂，中全裂片有细柄（长 2—9 毫米），近三角形，二回细裂，末回裂片线状披针形或线形，宽 0.8—1 毫米，侧全裂片近无柄，不等二深裂，深裂片细裂，表面无毛，背面疏被短伏毛；叶柄长 4.4—14 厘米，疏被柔毛或近无毛，基部有短鞘。花葶直立；苞片 2，长 3—3.8 厘米，叶柄有鞘，长 6—7 毫米，叶片掌状细裂；聚伞花序长 8—21 厘米，1—2 回分枝，有 2—5 花；花梗长 2—5.2 厘米；萼片 4，白色，长圆形或狭椭圆形，长 6.5—7.5 毫米，宽约 3 毫米，顶端圆形，有髯毛，外面疏被短伏毛；雄蕊 12—18，长 1.8—2.5 毫米，花药椭圆形，花丝近丝形；心皮 3—10，长约 2.5 毫米，无毛，子房狭卵形，花柱细，稍拳卷。瘦果扁，狭卵形，无毛，包括宿存花柱长 6 毫米。 11 月开花。

产云南南部（景洪、勐仑）。生河边草地。

组 4. 卵叶银莲花组——Sect. *Begoniifolia* (Ulbr.) Tamura in Sci. Rep. Osaka Univ. 16(2): 26. 1967——Sect. *Palsatilloides* subsect. *Brevistyla* Ulbr. ser. *Begoniifolia* Ulbr. in Bot. Jahrb. 37: 202, 243. 1906.

根状茎近垂直。基生叶数个，心状卵形，不分裂或三浅裂。花序伞形；苞片小，无柄或近无柄。花丝丝形或近丝形。心皮多数，背腹扁，无毛，背面有 1 纵肋，花柱短。

4 种，分布于我国西南部。 缅甸北部也有。

23. 拟卵叶银莲花 图版 7: 4—7

Anemone howellii J. F. Jerr. et W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinburgh. 9: 78. 1916.——*A. begoniifolioides* W. T. Wang, 植物分类学报 12: 167. 1974.

植株高 20—30 厘米。根状茎长约 5 厘米，粗 6 毫米。基生叶约 4，有长柄；叶片心状卵形或心形，长 3.8—7.3 厘米，宽 5.6—8 厘米，顶端渐尖或尾状渐尖，三浅裂，边缘有浅牙齿，两面疏被短糙伏毛，脉近平，不明显；叶柄长 8—15 厘米，疏被短柔毛。花葶粗 1.2—3.5 毫米，疏被短柔毛；苞片约 5，菱形或匙形，长 0.5—1.2 厘米，不分裂或三浅裂；伞辐 3—5，长 1.3—1.8 厘米，密被短柔毛；萼片 5，白色，倒卵形，长约 1 厘米，宽 7 毫米，无毛；雄蕊长 2—5 毫米，无毛，花药狭椭圆形，长 0.8—1 毫米，花丝近丝形；心皮多数，无毛，花柱短。 3 月至 8 月开花。

在我国分布于云南西部（腾冲）和东南部（屏边、河口、文山一带）、贵州西南部（安龙）。生海拔 1200—2300 米间山谷沟边阴湿处或疏林中。 在缅甸北部也有分布。模式标本采自云南腾冲。

24. 卵叶银莲花（中国高等植物图鉴） 图版 12: 1—5

Anemone begoniifolia Lévl. et Vant. in Bull. Acad. Geogr. Bot. 9:



1—3. 西藏银莲花 *Anemone tibetica* 1. 植株; 2. 雄蕊; 3. 心皮。4—7. 拟卵叶银莲花 *A. howellii* 4. 基生叶; 5. 花序; 6. 雄蕊; 7. 心皮。8. 河口银莲花 *A. hokouensis* 基生叶。
(吴影桦绘)