

46. 1902; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 51: 71. 1904; Ulbr. in Bot. Jahrb. 37: 243. 1906; 中国高等植物图鉴 1: 727, 图 1454. 1972.——*A. esquirolii* Lév. in Rep. Sp. Nov. 11: 446. 1911, non 1910.——*A. bodinieri* Lév. Fl. Kouy-Tchéou 329. 1915.

植株高 15—39 厘米。根状茎斜或近垂直,粗 3—6 毫米。基生叶 3—9,有长柄;叶片心状卵形或宽卵形,长 (1.5—)2.8—8.8 厘米,宽 (1.3—)2.2—8.4(—10) 厘米,顶端短渐尖,基部深心形或心形,不分裂或不明显三或五浅裂,边缘自基部之上有浅牙齿,两面疏被长柔毛;叶柄长 (2—)3—21 厘米,疏被开展的长柔毛或近无毛。花葶 1(—2),常紫红色,有与叶柄相同的毛;苞片 3,无柄,长圆形,长 0.6—1.4 厘米,不分裂或三裂,上部边缘有小齿;伞辐 3—7,长 1.5—4 厘米,密被短柔毛;萼片 5,白色,倒卵形,长 0.5—1.1(—1.3) 厘米,宽 2—5.5(—8) 毫米,外面有疏柔毛;雄蕊长 2—3 毫米,花丝丝形;心皮约 40,无毛,卵形,花柱极短,稍向外弯。聚合果直径约 4 毫米;瘦果菱状倒卵形,长约 2 毫米,在背面和腹面各有 1 纵肋。 2 月至 4 月开花。

分布于云南东南部(麻栗坡、文山,海拔约 1000 米)、广西西部、贵州、四川东南部(南川,650—820 米)。生山谷密林中或阴湿的沟边草地或岩石上。模式标本采自贵州独山。

25. 河口银莲花 图版 7: 9

Anemone hokouensis C. Y. Wu ex W. T. Wang, 植物分类学报 12: 168. 1974.

植株高 40—59 厘米。根状茎斜,长约 10 厘米,粗 1 厘米。基生叶 2,有长柄;叶片心状卵形或心形,长 10—14 厘米,宽 8.8—14 厘米,顶端渐尖,不明显三浅裂,边缘有小牙齿,表面疏被贴伏的短硬毛,下面沿隆起的脉上有短糙伏毛;叶柄长 14—31 厘米,有短曲柔毛。花葶 1,顶部密被短曲柔毛;苞片约 9,菱形或倒卵形,长 1—1.4 厘米,不分裂或三浅裂;伞辐 4—5,长 1.2—2 厘米,密被贴伏的短柔毛;萼片 5,紫色,倒卵形或狭倒卵形,长 1.2—2 厘米,宽 0.8—1.4 厘米,外面只在基部有短柔毛,雄蕊长 2—5.5 毫米,花药狭椭圆形,长约 1.2 毫米,顶端有短尖,花丝近丝形;心皮多数,无毛,花柱短。 5 月至 6 月开花。

产云南河口。生海拔 1200 米一带山地。

26. 直果银莲花

Anemone orthocarpa Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 176. 1939.

植株高 15—32 厘米。根状茎近垂直,短而粗。基生叶 4—6,有长柄;叶片五角形,长 3—5 厘米,宽 3.2—7 厘米,基部心状截形,三深裂至距基部 3—5 毫米处,中深裂菱形或狭菱形,顶端渐尖或长渐尖,在中部三浅裂,边缘有少数小牙齿,侧深裂片不等二裂近中部,两面沿脉有贴伏的微硬毛;叶柄长 5—15 厘米,疏被白色柔毛。花葶细,有疏柔毛;苞



1—3. 西藏银莲花 *Anemone tibetica* 1. 植株; 2. 雄蕊; 3. 心皮。4—7. 拟卵叶银莲花 *A. howellii* 4. 基生叶; 5. 花序; 6. 雄蕊; 7. 心皮。8. 河口银莲花 *A. hokouensis* 基生叶。
(吴影桦绘)