

46. 1902; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 51: 71. 1904; Ulbr. in Bot. Jahrb. 37: 243. 1906; 中国高等植物图鉴 1: 727, 图 1454. 1972.——*A. esquirolii* Lév. in Rep. Sp. Nov. 11: 446. 1911, non 1910.——*A. bodinieri* Lév. Fl. Kouy-Tchéou 329. 1915.

植株高 15—39 厘米。根状茎斜或近垂直,粗 3—6 毫米。基生叶 3—9,有长柄;叶片心状卵形或宽卵形,长 (1.5—)2.8—8.8 厘米,宽 (1.3—)2.2—8.4(—10) 厘米,顶端短渐尖,基部深心形或心形,不分裂或不明显三或五浅裂,边缘自基部之上有浅牙齿,两面疏被长柔毛;叶柄长 (2—)3—21 厘米,疏被开展的长柔毛或近无毛。花葶 1(—2),常紫红色,有与叶柄相同的毛;苞片 3,无柄,长圆形,长 0.6—1.4 厘米,不分裂或三裂,上部边缘有小齿;伞辐 3—7,长 1.5—4 厘米,密被短柔毛;萼片 5,白色,倒卵形,长 0.5—1.1(—1.3) 厘米,宽 2—5.5(—8) 毫米,外面有疏柔毛;雄蕊长 2—3 毫米,花丝丝形;心皮约 40,无毛,卵形,花柱极短,稍向外弯。聚合果直径约 4 毫米;瘦果菱状倒卵形,长约 2 毫米,在背面和腹面各有 1 纵肋。 2 月至 4 月开花。

分布于云南东南部(麻栗坡、文山,海拔约 1000 米)、广西西部、贵州、四川东南部(南川,650—820 米)。生山谷密林中或阴湿的沟边草地或岩石上。模式标本采自贵州独山。

25. 河口银莲花 图版 7: 9

Anemone hokouensis C. Y. Wu ex W. T. Wang, 植物分类学报 12: 168. 1974.

植株高 40—59 厘米。根状茎斜,长约 10 厘米,粗 1 厘米。基生叶 2,有长柄;叶片心状卵形或心形,长 10—14 厘米,宽 8.8—14 厘米,顶端渐尖,不明显三浅裂,边缘有小牙齿,表面疏被贴伏的短硬毛,下面沿隆起的脉上有短糙伏毛;叶柄长 14—31 厘米,有短曲柔毛。花葶 1,顶部密被短曲柔毛;苞片约 9,菱形或倒卵形,长 1—1.4 厘米,不分裂或三浅裂;伞辐 4—5,长 1.2—2 厘米,密被贴伏的短柔毛;萼片 5,紫色,倒卵形或狭倒卵形,长 1.2—2 厘米,宽 0.8—1.4 厘米,外面只在基部有短柔毛,雄蕊长 2—5.5 毫米,花药狭椭圆形,长约 1.2 毫米,顶端有短尖,花丝近丝形;心皮多数,无毛,花柱短。 5 月至 6 月开花。

产云南河口。生海拔 1200 米一带山地。

26. 直果银莲花

Anemone orthocarpa Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 176. 1939.

植株高 15—32 厘米。根状茎近垂直,短而粗。基生叶 4—6,有长柄;叶片五角形,长 3—5 厘米,宽 3.2—7 厘米,基部心状截形,三深裂至距基部 3—5 毫米处,中深裂菱形或狭菱形,顶端渐尖或长渐尖,在中部三浅裂,边缘有少数小牙齿,侧深裂片不等二裂近中部,两面沿脉有贴伏的微硬毛;叶柄长 5—15 厘米,疏被白色柔毛。花葶细,有疏柔毛;苞

片5—10, 狭菱形, 长0.6—1.8厘米, 基部狭楔形, 三浅裂, 有小齿, 伞辐1—6, 长1.5—8.5厘米, 密被白色短糙毛; 花直径1—1.5厘米; 萼片5, 白色, 倒卵形, 无毛; 花药椭圆形, 花丝丝形; 心皮多数。瘦果卵形, 长约4毫米, 无毛, 有4条纵肋, 宿存花柱短, 向外弯。2月开花。

产贵州兴义。

组5. 打破碗花花组——Sect. *Anemone*——Sect. *Oriba* (Adanson) Spach, *Hist. Nat. Vég. Phán.* 7. 1839——Sect. *Erioccephalus* Hook. f. et Thoms. *Fl. Ind.* 1: 20. 1856.——Gen. *Eriocapitella* Nakai in *Jap. Journ. Bot.* 17: 267. 1941.

根状茎圆柱状或块状。基生叶为单叶或三出复叶。聚伞花序分枝, 有多数花或只有1花; 苞片似基生叶, 有柄或无柄。花丝丝形或狭线形。瘦果有密绵毛。

20余种, 分布于亚洲、欧洲和南、北美洲。我国有7种, 分布于西南、华中、西北、华北和东北部。

27. 打破碗花花(四川) 野棉花(四川、湖南、湖北、陕西), 遍地爬、五雷火(湖南), 霸王草(贵州), 满天飞、盖头花(湖北), 山棉花、火草花、大头翁(陕西) 图版6: 1—3

Anemone hupehensis Lem. *Catalogue* 176: 40. 1910; Bowles et Stearn in *Journ. Roy. Hort. Soc.* 72: 261. 1947; 中国高等植物图鉴 1: 728, 图1455. 1972; 秦岭植物志 1(2): 282. 1974.——*A. japonica* auct. non Sieb. et Zucc.; 中国药用植物志 1: 图16. 1955.

植株高(20—)30—120厘米。根状茎斜或垂直, 长约10厘米, 粗(2—)4—7毫米。基生叶3—5, 有长柄, 通常为三出复叶, 有时1—2个或全部为单叶; 中央小叶有长柄(长1—6.5厘米), 小叶片卵形或宽卵形, 长4—11厘米, 宽3—10厘米, 顶端急尖或渐尖, 基部圆形或心形, 不分裂或3—5浅裂, 边缘有锯齿, 两面有疏糙毛; 侧生小叶较小, 叶柄长3—36厘米, 疏被柔毛; 基部有短鞘。花葶直立, 疏被柔毛; 聚伞花序2—3回分枝, 有较多花, 偶尔不分枝, 只有3花; 苞片3, 有柄(长0.5—6厘米), 稍不等大, 为三出复叶, 似基生叶; 花梗长3—10厘米, 有密或疏柔毛; 萼片5, 紫红色或粉红色, 倒卵形, 长2—3厘米, 宽1.3—2厘米, 外面有短绒毛; 雄蕊长约为萼片长度的1/4, 花药黄色, 椭圆形, 花丝丝形; 心皮约400, 生于球形花托上, 长约1.5毫米, 子房有长柄, 有短绒毛, 柱头长方形。聚合果球形, 直径约1.5厘米; 瘦果长约3.5毫米, 有细柄, 密被绵毛。7月至10月开花。

分布于四川、陕西南部、湖北西部、贵州、云南东部、广西北部、广东北部、江西、浙江(天台山)。海拔400—1800米间低山或丘陵的草坡或沟边。模式标本采自湖北。

根状茎药用, 治热性痢疾、胃炎、各种顽癣、疟疾、消化不良、跌打损伤等症(陕西中草药)。全草用作土农药, 水浸液可防治稻苞虫、负泥虫、稻螟、棉蚜、菜青虫、蝇蛆等, 以及小