

植株高 60—100 厘米。根状茎斜,木质,粗 0.8—1.5 厘米。基生叶 2—5,有长柄;叶片心状卵形或心状宽卵形,长 (5.2—) 11—22 厘米,宽 (6—) 12—26 厘米,顶端急尖,3—5 浅裂,边缘有小牙齿,表面疏被短糙毛,背面密被白色短绒毛;叶柄长 (6.5—) 25—60 厘米,有柔毛。花葶粗壮,有密或疏的柔毛;聚伞花序长 20—60 厘米,2—4 回分枝;苞片 3,形状似基生叶,但较小,有柄(长 1.4—7 厘米);花梗长 3.5—5.5 厘米,密被短绒毛;萼片 5,白色或带粉红色,倒卵形,长 1.4—1.8 厘米,宽 8—13 毫米,外面有白色绒毛;雄蕊长约为萼片长度的 1/4,花丝丝形;心皮约 400,子房密被绵毛。聚合果球形,直径约 1.5 厘米;瘦果有细柄,长约 3.5 毫米,密被绵毛。7 月至 10 月开花。

在我国分布于云南(海拔 1200—2700 米)、四川西南部(米易,海拔 1800 米)、西藏东南部 and 南部(2200—2700 米)。生山地草坡、沟边或疏林中。在缅甸北部、不丹、锡金、尼泊尔、印度北部也有分布。

根状茎供药用,治跌打损伤、风湿关节痛、肠炎、痢疾、蛔虫病等症,也可作土农药,灭蝇蛆等。

30. 西藏银莲花 图版 7: 1—3

Anemone tibetica W. T. Wang in Addenda.


植株高约 40 厘米。茎基的分枝长 2—4 厘米,顶端生出 1 条花葶和数个基生叶。基生叶有长柄;叶片心状五角形,长 2.5—5.8 厘米,宽 3—8.2 厘米,三裂达或至距基部 1—4 毫米处,中裂片菱状椭圆形,顶端急尖,三浅裂,边缘有不整齐小牙齿,侧裂片稍小,不等二浅裂,两面都有短柔毛;叶柄长 3.5—17 厘米,有开展的疏柔毛,基部有短鞘。花葶有开展的短柔毛;苞片 3,无柄,稍不等大,卵形,长 2.5—3.5 厘米,三浅裂;花梗 2,长 8—10 厘米;花直径约 3.5 厘米;萼片 5,白色,不等大,宽卵形或卵形,长 1.8—2 厘米,宽 0.9—1.9 厘米,外面密被贴伏的绢状短柔毛;雄蕊长 4—5 毫米,花药椭圆形,长约 1.5 毫米,花丝丝形;心皮约 50,长约 1.2 毫米,子房密被柔毛,花柱近钻形,与子房等长。8 月开花。

产西藏朗县。生海拔 3100 米一带山谷沟边。

31. 岩生银莲花(中国高等植物图鉴) 图版 5: 6—8

Anemone rupicola Camb. in Jacq. Voy. 4: 5, f. 2. 1838; Hook. f. et Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 8. 1872; Franch. pl. Delav. 7. 1889; Ulbr. in Bot. Jahrb. 37: 256. 1906. — *A. batangensis* Finet in Journ. de Bot. 21: 30. 1908.

植株高 6—20(—30) 厘米。根状茎垂直或斜,长 4—10 厘米,粗 2.5—4 毫米。基生叶 3—4,有长柄;叶片心状五角形,长 1.5—6 厘米,宽 2.4—11 厘米,三全裂,中全裂片有短柄,菱形,三裂,边缘有小裂片和锐齿,侧全裂片斜菱形,有短柄,二深裂近基部,表面近无毛,背面疏被短柔毛或近无毛,常带紫色;叶柄长 3—10 厘米,近无毛。花葶 1,只在



1—5. 草玉梅 *Anemone rivularis* 1. 植株; 2. 雄蕊; 3. 心皮; 4. 聚合果; 5. 瘦果。6—8. 岩生银莲花 *A. rupicola* 6. 植株; 7. 瘦果; 8. 聚合果。9—13. 细裂银莲花 *A. filisecta* 9. 花序; 10. 基生叶; 11. 雄蕊; 12. 心皮; 13. 瘦果。(赵宝恒绘)

总苞之下有密柔毛；苞片2(—3)，无柄，菱状卵形或宽卵形，长1.5—4.5厘米，三深裂；花梗1(—2)，长2.5—7厘米，有柔毛；萼片5，白色，倒卵形，长1.8—2.5(—3.3)厘米，宽1.2—1.7(—2.5)厘米，外面有密柔毛；雄蕊长约为萼片长度的1/4，花药椭圆形，花丝丝形；心皮90—120，生于球形花托上，长约1.5毫米，子房密被绵毛，花柱短，柱头扁球形。聚合果下垂，直径约1.8厘米；瘦果近椭圆球形，腹面密被长绵毛。 6月至8月开花。

在我国分布于云南西北部、四川西部、西藏东南部和南部。 生海拔2400—4200米间山地石崖上或多石砾的坡地、山谷沟边或林下。 在不丹、锡金、尼泊尔、印度北部也有分布。

32. 锐裂银莲花 图1

Anemone laceratoincisa W. T. Wang in Addenda.

植株高约23厘米。基生叶约4，具长柄；叶片心状五角形，长2.7—4.5厘米，宽3.5—7厘米，三全裂，中全裂片菱形，顶端急尖，三深裂，二回裂片又二回分裂，末回裂片狭三角形或三角形，顶端尖锐，侧全裂片斜菱形，不等二深裂，表面近无毛，背面沿脉有较密的绢状长柔毛，脉在上面稍下陷；叶柄长6.5—11厘米，疏被绢状柔毛，基部稍变宽成狭鞘。花萼密被反曲的绢状长柔毛；总苞苞片3，无柄，形状似基生叶的中全裂片，长约3.8厘米，宽约2.8厘米；花单生，直径约4.6厘米；花梗长约6.2厘米，密被开展的长柔毛；萼片5，白色，椭圆形，长2.5—2.7厘米，宽1.4—1.6厘米，顶端钝，稍啮蚀状，内面无毛，外面有贴伏的绢状长柔毛；雄蕊多数，长2.5—6毫米，花药椭圆形，长0.8—1.1毫米，花丝丝形，长2—5毫米；心皮群近球形，直径约5毫米，心皮约50，长约2.2毫米，子房椭圆形，密被柔毛，花柱与子房近等长，柱头不明显。




图1: 锐裂银莲花 *Anemone laceratoincisa*
1. 基生叶; 2. 花序; 3. 雄蕊。(刘春荣绘)

产甘肃文县。

本种近前种岩生银莲花，但叶分裂较深，末回裂片狭三角形或三角形，背面有较密的绢状长柔毛，苞片3，萼片椭圆形，心皮数目较少，可以区别。

33. 大花银莲花(东北植物检索表) 图版6: 7—9

Anemone silvestris L. Sp. pl. 540. 1753; DC. Prodr. 1: 20. 1824; 中国高等植物图鉴 1: 729, 图1457. 1972; 东北草本植物志 3: 156. 1975.

植株高18—50厘米。根状茎垂直或稍斜，长达3厘米，粗2—2.5毫米。基生叶3—