

35. 钝裂银莲花 图版 8: 11

Anemone obtusiloba D. Don, Prodr. Fl. Nep. 194. 1825; Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 22. 1855; Brühl in Ann. Bot. Gard. Calc. 5: 78. 1896; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 23: 181. 1960.—*A. micrantha* Klotzsch in Bot. Ergeb. Waldem. Reise 133, t. 38. 1862.—*A. obtusiloba* ssp. *micrantha* (Klotzsch) Ulbr. in Bot. Jahrb. 37: 242. 1906.

植株高 10—30 厘米。基生叶 7—15，有长柄，多少密被短柔毛；叶片肾状五角形或宽卵形，长 1.2—3 厘米，宽 1.7—5.5 厘米，基部心形，三全裂或偶而三裂近基部，中全裂片菱状倒卵形，二回浅裂，侧全裂片与中全裂片近等大或稍小，各回裂片互相多少邻接或稍覆盖，脉近平；叶柄 3—18 厘米。花葶 2—5，有开展的柔毛；苞片 3，无柄，稍不等大，宽菱形或楔形，常三深裂，长 1—2 厘米，多少密被柔毛；花梗 1—2，长 1.5—8 厘米；萼片 5(—8)，白色，蓝色或黄色，倒卵形或狭倒卵形，长 0.8—1.2 厘米，宽 5—8 毫米，外面有疏毛；雄蕊长约 4 毫米，花药椭圆形；心皮约 8，子房密被柔毛。5 月至 7 月开花。

在我国分布于西藏南部和东部、四川西部。生海拔 2900—4000 米间高山草地或铁杉林下。在尼泊尔、锡金、不丹、印度北部也有分布。

35b. 镇康银莲花(亚种) 图版 8: 7

Anemone obtusiloba ssp. **megaphylla** W. T. Wang in Addenda.

与钝裂银莲花的区别：叶较大，叶片长 3.2—6 厘米，宽 6—10 厘米，三深裂近基部，深裂片互相覆盖。植株高约 35 厘米。叶脉平，叶片两面多少密被糙毛。花序有 2 花；苞片楔形或宽菱形，长 1.8—3.2 厘米，三深裂；萼片 5，蓝色；心皮约 9，子房密被褐黄色柔毛。

产云南镇康。生海拔 3400 米山地草坡。

35c. 光叶银莲花(亚种) 图版 8: 8

Anemone obtusiloba ssp. **leiophylla** W. T. Wang in Addenda.

与钝裂银莲花的区别：叶和苞片背面无毛或近无毛，中脉和侧脉在两面常稍隆起。植株高 7.5—34 厘米。叶三全裂。花序有 1 花；苞片长圆状卵形，不分裂，全缘或有 3 齿；萼片 5(—6—7)，白色；心皮 10—20，子房密被白色柔毛。

产云南贡山。生海拔 2900—3000 米间山地草坡或林边。

35d. 疏齿银莲花(秦岭植物志)(亚种) 图版 9: 1—3

Anemone obtusiloba ssp. **ovalifolia** Brühl in Ann. Bot. Gard. Calc. 5: 78, pl. 106B, f. 23, 27—30. 1896; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 23: 189. 1960; 秦岭植物志 1(2): 283. 1974.—*A. obtusiloba* ssp. *ovalifolia* var. *geochares* et var. *orthocaulon* Brühl, l. c.—*A. rupestris* var. *lobata* Brühl, l. c. 80.—*A. geum* Lévl. in Bull. Acad. Géogr. Bot. 25: 25. 1915; Hand.-Mazz.



1—3. 川甘银莲花 *Anemone rockii* 1. 植株外形; 2. 雄蕊; 3. 瘦果。4—6. 块根银莲花 *A. gortschakovii* 4. 植株外形; 雄蕊和心皮; 6. 雄蕊。7—11. 基生叶叶片: 7. 镜康银莲花 *A. obtusiloba* ssp. *megaphylla*; 8. 光叶银莲花 *A. obtusiloba* ssp. *leiophylla*; 9. 多茎银莲花 *A. rockii* var. *multicaulis*; 10. 巫溪银莲花 *A. rockii* var. *pilocarpa*; 11. 钝裂银莲花 *A. obtusiloba*。(王金凤绘)