

Edinb. 7: 110. 1912, nom. nud.——*A. coelestina* var. *truncata* Comber, l. c. 18: 226. 1934.——*A. obtusiloba* ssp. *ovalifolia* Brühl X *A. trullifolia* Hook. f. et Thoms., Lauener in Not. Bot. Gard Edinb. 23(2): 192. 1960.

与卵叶银莲花的区别：叶片三浅裂或三深裂，基部截状心形或浅心形。植株高6—15厘米。叶片长1—3.5厘米，两面多少密被柔毛。萼片5(—6)，白色、蓝色或黄色。

分布于云南(丽江)、四川(木里)。生海拔2600—3900米间山地草坡或冷杉林下。

36. 岷山银莲花(秦岭植物志) 图版8: 1—3

Anemone rockii Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berl. 10: 876. 1929, 秦岭植物志 1(2): 284. 1974.——*A. obtusiloba* ssp. *rockii* (Ulbr.) Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 23: 188. 1960, p. p.

植株高15—26厘米。根状茎直，短，有须根。基生叶5—15，有长柄；叶片宽卵形，长1.6—3厘米，宽1.5—4.5厘米，基部心形，三全裂，中全裂片宽卵形或宽菱形，有短柄，三裂至或稍超过中部，二回裂片多少细裂，末回裂片互相稍覆压或邻接，侧全裂片近无柄，斜扇形，不等三裂，两面无毛或表面有稀疏柔毛，叶柄长5—12厘米，有疏柔毛或变无毛。花葶2—10，无毛或有疏柔毛；苞片3，无柄，长1.5—2.5厘米，倒卵形，三浅裂或裂至中部，裂片有齿，有时其中一个长圆形，不分裂；花梗1，长2.5—8.5厘米；萼片7—8，白色，长圆形或长圆状倒卵形，有时倒卵形，长1.5—1.8厘米，宽5—11毫米，外面有疏柔毛；雄蕊长约5毫米，花药长1.5—2毫米；心皮15—32，无毛或近无毛。6月至8月开花。

分布于四川西北部(和平)、甘肃南部(西固一带)。生海拔3400—4000米间山地草坡。模式标本采自甘肃岷山一带。

本种与钝裂银莲花 *A. obtusiloba* 相近，但叶的中全裂片超过中部，末回裂片常狭长并疏离，可以区别。除了叶的分裂特征以外，在川甘银莲花，萼片数目多于5个(6—8)，心皮无毛或近无毛，也可与钝裂银莲花的多数类型相区别。

36b. 巫溪银莲花(变种) 图版8: 10

Anemone rockii var. *pilocarpa* W. T. Wang in Addenda.

与岷山银莲花的区别：叶的各回裂片互相分开；子房密被柔毛。萼片8—9，白色。产四川东北部(巫溪、城口)。生海拔2100—2300米间山地草坡。

36c. 多茎银莲花(变种) 图版8: 9


Anemone rockii var. *multicaulis* W. T. Wang in Addenda.

与岷山银莲花的区别：叶的各回裂片互相分开；萼片6(白色或蓝色)；子房密被柔毛。

产四川西昌。生海拔2900—3100米间山地草坡。

37. 天全银莲花 图版10: 1—3

Anemone patula Chang ex W. T. Wang, 植物分类学报 12: 169. 1974.



1—3. 川甘银莲花 *Anemone rockii* 1. 植株外形; 2. 雄蕊; 3. 瘦果。4—6. 块根银莲花 *A. gortschakovii* 4. 植株外形; 雄蕊和心皮; 6. 雄蕊。7—11. 基生叶叶片: 7. 镇康银莲花 *A. obtusiloba* ssp. *megaphylla*; 8. 光叶银莲花 *A. obtusiloba* ssp. *leiophylla*; 9. 多茎银莲花 *A. rockii* var. *multicaulis*; 10. 巫溪银莲花 *A. rockii* var. *pilocarpa*; 11. 钝裂银莲花 *A. obtusiloba*。(王金凤绘)