

裂片边缘全缘或有牙齿。花萼不分枝；苞片3，轮生，形成总苞，分生，与花靠近而呈萼片状。花单生花萼顶端，两性；萼片5—10，稀更多，花瓣状，狭倒卵形或长圆形；花瓣不存在；雄蕊多数，花药椭圆形，花丝狭线形；心皮多数，有短花柱，子房有1颗胚珠。瘦果卵球形。

约7种，分布于北半球温带。我国有2种，1种分布于四川、湖北，1种分布于华东和辽宁。

本属的獐耳细辛可供药用。

分种检索表

1. 叶的裂片有1—2牙齿；苞片全缘或有3小齿(四川、湖北西部)……………1. 川鄂獐耳细辛 *H. henryi* (Oliv.) Steward
1. 叶的裂片和苞片均全缘(浙江、安徽、河南、辽宁)……2. 獐耳细辛 *H. nobilis* var. *asiatica* (Nakai) Hara

1. 川鄂獐耳细辛(中国高等植物图鉴) 图版17: 1—3


Hepatica henryi (Oliv.) Steward in *Rhodora* 29: 53. 1927. — *Anemone henryi* Oliv. in *Hook. Ic. Pl.* 16: pl. 1570. 1887; Ulbr. in *Bot. Jahrb.* 37: 272. 1906. — *Hepatica yamatutai* Nakai in *Journ. Jap. Bot.* 13: 311, f. 14. 1937; 中国高等植物图鉴 1: 732, 图1464. 1972. — *Anemone yamatutai* (Nakai) Hara in *Journ. Jap. Bot.* 33: 271. 1958.

植株在开花时高4—6厘米，以后高达12厘米。根状茎长约2.5厘米，粗约3毫米，密生须根。基生叶约6，有长柄；叶片宽卵形或圆肾形，长1.5—5.5厘米，宽2—8.5厘米，基部心形，不明显三浅裂或三裂近中部，裂片顶端急尖，边缘有1—2个牙齿，两面有长柔毛，变无毛；叶柄长4—12厘米，稍密被柔毛。花萼1—2条，近直立，有柔毛；苞片3，卵形，长5—11毫米，宽3—6毫米，顶端急尖，全缘或有3小齿，有疏柔毛；萼片6，倒卵状长圆形或狭椭圆形，长8—12毫米，宽3—5.5毫米，外面有疏柔毛；雄蕊长2—3.5毫米，花药椭圆形，长约0.5毫米，花丝近丝形；心皮约10，子房有长柔毛，花柱短，稍向外弯。4月至5月开花。

分布于四川、湖北西部(巴东)。生海拔1300—2500米间山地林下或阴湿草坡。模式标本采自湖北巴东。

2. 獐耳细辛(本草纲目) 幼肺三七(浙江) 图版17: 4

Hepatica nobilis Schreb. var. *asiatica* (Nakai) Hara in *Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, sect. 3, 6: 51. 1952; 中国高等植物图鉴 1: 733, 图1465. 1972; 东北草本植物志 3: 160. 1975. — *Anemone hepatica* auct. non L.; Baker et S. Moore in *Journ. Linn. Soc. Bot.* 17: 375. 1879; Hemsl. l. c. 33: 11. 1886 — *Hepatica asiatica* Nakai in *Journ. Jap. Bot.* 13: 307. 1937; Kitag. *Lineam. Fl. Mansh.* 220. 1939. — *Anemone hepatica* L. var. *asiatica* (Nakai) Hara in *Jou-*



1—3. 川鄂獐耳细辛 *Hepatica henryi* 1. 植株全形; 2. 雄蕊; 3. 心皮。4. 獐耳细辛 *H. nobilis* var. *asiatica* 植株全形, 稍缩小。(赵宝恒, 张泰利绘)

rn. Jap. Bot. 33: 273. 1958.

植株高 8—18 厘米。根状茎短，密生须根。基生叶 3—6，有长柄；叶片正三角状宽卵形，长 2.5—6.5 厘米，宽 4.5—7.5 厘米，基部深心形，三裂至中部，裂片宽卵形，全缘，顶端微钝或钝，有时有短尖头，有稀疏的柔毛；叶柄长 6—9 厘米，变无毛。花葶 1—6 条，有长柔毛；苞片 3，卵形或椭圆状卵形，长 7—12 毫米，宽 3—6 毫米，顶端急尖或微钝，全缘，背面稍密被长柔毛；萼片 6—11，粉红色或堇色，狭长圆形，长 8—14 毫米，宽 3—6 毫米，顶端钝；雄蕊长 2—6 毫米，花药椭圆形，长约 0.7 毫米；子房密被长柔毛。瘦果卵球形，长 4 毫米，有长柔毛和短宿存花柱。4 月至 5 月开花。

在我国分布于浙江(天目山)、安徽(金特)、河南(高城)、辽宁东南部。生山地杂木林内或草坡石下阴处。在朝鲜也有分布。

根状茎药用，治劳伤、筋骨痛等症(浙江天目山药用植物志)。

28. 罂粟莲花属 — *Anemoclema* (Franch.) W. T. Wang

W. T. Wang, 植物分类学报 9: 105. 1964. — *Anemone* L. sect.

Anemoclema Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 36: 363. 1886. —

Anemone sect. *Pulsatilloides* DC. ser. *Anemoclema* (Franch.)

Ulbr. in Bot. Jahrb. 37: 240. 1906.

多年生草本，有根状茎。基生叶 4—7，有短柄，大头羽状深裂或全裂，叶脉羽状。花葶直立。聚伞花序有少数花；总苞由 3 苞片组成，苞片轮生，分生，羽状浅裂。花规则，相当大，美丽。萼片 5，花瓣状，倒卵形，蓝紫色。花瓣不存在。雄蕊多数，花丝扁平，披针状线形，有 1 条中脉，花药椭圆形，有短尖，花粉有刺。心皮多数，无柄，子房有密柔毛，花柱细长。瘦果近椭圆球形，有长柔毛，宿存花柱与瘦果近等长或稍长，被短柔毛。

1 种，特产我国云南西北部 and 四川西南部。

罂粟莲花 图版 18

Anemoclema glaucifolium (Franch.) W. T. Wang, 植物分类学报 9: 106. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 732, 图 1463. 1972. — *Anemone glaucifolia* Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 33: 363. 1886; pl. Delav. 6, pl. 1. 1889; Ulbr. in Bot. Jahrb. 37: 240. 1906; Stapf in Curtis's Bot. Mag. 151: t. 9114. 1926; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 314. 1931. — *Pulsatilla glaucifolia* (Franch.) Huth in Bot. Jahrb. 22: 588. 1898.

植株高 45—80(—150) 厘米。根状茎直或斜，粗 0.6—1.8 厘米。叶片匙状长圆形或长圆形，长 5.5—17 厘米，宽 2.8—7 厘米，顶端圆形或钝，基部近截形，一回裂片 3—8 对，近对生或互生，近平展或稍斜上展，中部的近菱形，基部通常沿羽轴下延，顶端钝，有短尖，羽状分裂，有 1—2 对裂片，表面疏被柔毛，背面沿羽轴密被长柔毛，叶柄扁，有时具狭翅，