

rn. Jap. Bot. 33: 273. 1958.

植株高 8—18 厘米。根状茎短，密生须根。基生叶 3—6，有长柄；叶片正三角状宽卵形，长 2.5—6.5 厘米，宽 4.5—7.5 厘米，基部深心形，三裂至中部，裂片宽卵形，全缘，顶端微钝或钝，有时有短尖头，有稀疏的柔毛；叶柄长 6—9 厘米，变无毛。花葶 1—6 条，有长柔毛；苞片 3，卵形或椭圆状卵形，长 7—12 毫米，宽 3—6 毫米，顶端急尖或微钝，全缘，背面稍密被长柔毛；萼片 6—11，粉红色或堇色，狭长圆形，长 8—14 毫米，宽 3—6 毫米，顶端钝；雄蕊长 2—6 毫米，花药椭圆形，长约 0.7 毫米；子房密被长柔毛。瘦果卵球形，长 4 毫米，有长柔毛和短宿存花柱。4 月至 5 月开花。

在我国分布于浙江(天目山)、安徽(金特)、河南(高城)、辽宁东南部。生山地杂木林内或草坡石下阴处。在朝鲜也有分布。

根状茎药用，治劳伤、筋骨痛等症(浙江天目山药用植物志)。

28. 罂粟莲花属 — *Anemoclema* (Franch.) W. T. Wang

W. T. Wang, 植物分类学报 9: 105. 1964. — *Anemone* L. sect.

Anemoclema Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 36: 363. 1886. —

Anemone sect. *Pulsatilloides* DC. ser. *Anemoclema* (Franch.)

Ulbr. in Bot. Jahrb. 37: 240. 1906.

多年生草本，有根状茎。基生叶 4—7，有短柄，大头羽状深裂或全裂，叶脉羽状。花葶直立。聚伞花序有少数花；总苞由 3 苞片组成，苞片轮生，分生，羽状浅裂。花规则，相当大，美丽。萼片 5，花瓣状，倒卵形，蓝紫色。花瓣不存在。雄蕊多数，花丝扁平，披针状线形，有 1 条中脉，花药椭圆形，有短尖，花粉有刺。心皮多数，无柄，子房有密柔毛，花柱细长。瘦果近椭圆球形，有长柔毛，宿存花柱与瘦果近等长或稍长，被短柔毛。

1 种，特产我国云南西北部 and 四川西南部。

罂粟莲花 图版 18

Anemoclema glaucifolium (Franch.) W. T. Wang, 植物分类学报 9: 106. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 732, 图 1463. 1972. — *Anemone glaucifolia* Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 33: 363. 1886; pl. Delav. 6, pl. 1. 1889; Ulbr. in Bot. Jahrb. 37: 240. 1906; Stapf in Curtis's Bot. Mag. 151: t. 9114. 1926; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 314. 1931. — *Pulsatilla glaucifolia* (Franch.) Huth in Bot. Jahrb. 22: 588. 1898.

植株高 45—80(—150) 厘米。根状茎直或斜，粗 0.6—1.8 厘米。叶片匙状长圆形或长圆形，长 5.5—17 厘米，宽 2.8—7 厘米，顶端圆形或钝，基部近截形，一回裂片 3—8 对，近对生或互生，近平展或稍斜上展，中部的近菱形，基部通常沿羽轴下延，顶端钝，有短尖，羽状分裂，有 1—2 对裂片，表面疏被柔毛，背面沿羽轴密被长柔毛，叶柄扁，有时具狭翅，