

布。模式标本采自黑龙江。

亚组 2. 大叶铁线莲亚组——Subsect. *Tubulosae* Decne. ex Schneid. Handl. Laubh. 1: 281. 1905; Tamura in Sci. Rep. Osak. Univ. 16(2): 32. 1967.——Ser. *Tubulosae* (Decne.) Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: 320. 1913.——*Clematis* § *Tubulosae* Decne. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, ser. 2, 4: 203. 1881.

直立灌木或草本。三出复叶，稀羽状复叶；小叶片草质，边缘有齿，叶柄不缠绕。花萼管状。雄蕊仅花丝顶端微被柔毛。

约 10 种，分布于亚洲温带至热带。我国约有 3 种，2 种产于华北，1 种产于台湾。

3. 台中铁线莲 图 2

Clematis tsugetorum Ohwi in Act. Phytotax. Geobot. 2: 153. 1933.

直立丛生小灌木，高达 30 厘米。茎圆柱形，微有六棱及纵沟纹，小枝有白色短绒毛。羽状复叶有 3 小叶，有时顶端仅为单叶 3 深裂；顶生小叶片宽卵形或近于圆形，长 1—2.5 厘米，宽 1—2.2 厘米，有时 3 裂，顶端锐尖，边缘有缺刻状锯齿，基部宽楔形、圆形至截形，上面绿色，被疏柔毛，下面淡绿色，沿叶脉有柔毛，小叶柄长 0.5—1.5 厘米；侧生小叶无柄，小叶片斜卵形，长 0.8—2.5 厘米，宽 0.8—2 厘米，边缘有不规则的锐锯齿；叶柄长 1—5 厘米，与小叶柄都有柔毛。单花腋生或顶生，花梗纤细，长 3—4 厘米，无苞片，密生短柔毛；花钟状下垂，直径 1 厘米；萼片 4 枚，倒卵形或匙形，长 1—1.5 厘米，上半部反卷，外面密生柔毛，内面无毛；花丝钻状，与花药近于等长，长 3—4 毫米，仅药隔背面有柔毛，其余无毛；心皮被柔毛。

产我国台湾。

4. 大叶铁线莲 (东北植物检索表) 木通花(经济植物手册)，草牡丹、草本女娄、气




图 2: 台中铁线莲 *Clematis tsugetorum*

1. 植株; 2. 花; 3. 雄蕊内面; 4. 雄蕊外面。(陈荣道绘)