

1.5 厘米，宽 5 毫米，顶端钝尖，两面有稀疏短柔毛或近于无毛，边缘有绒毛；雄蕊与萼片等长，花丝细瘦，密被柔毛，花药线形，长 2—3 毫米，无毛；心皮在开花时与雄蕊等长，子房窄卵形，花柱纤细，全被绢状柔毛。果实未见。 花期 12 月。

产云南碧江碧罗山。生海拔 2700 米一带山地阴坡灌木丛中。

本种与云南铁线莲 *C. yunnanensis* 相近，不同在于三出复叶，小叶片革质，全缘，单花腋生，可以区别。

11. 安顺铁线莲 图 6

Clematis anshunensis M. Y. Fang in Addenda.

草质藤本，长约 1 米。茎圆柱形，褐色或淡棕色，光滑无毛。三出复叶；小叶片亚革质

或纸质，卵圆形至椭圆披针形，长 5—9 厘米，宽 2—4 厘米，顶端有尾状渐尖，基部圆形或阔楔形，上部边缘有稀疏细锯齿，下部全缘，仅幼时上面中脉上有短柔毛，其余两面无毛，叶脉在表面不显明，在背面主脉微隆起；小叶柄短，长不超过 5 毫米；叶柄长 2—5 厘米，上面有槽，光滑无毛。聚伞花序腋生，1—3 花，无毛，花序梗短或长达 1.2 厘米，有鳞状苞片，花梗细瘦，长达 3 厘米；花萼钟状，直径 1 厘米；萼片 4 枚，白色，长方椭圆形，长 1.5 厘米，宽 4—5 毫米，顶端钝尖，两面无毛，仅边缘被毡绒毛；雄蕊与萼片近于等长，花丝线形，背面及两侧有开展的长柔毛，花药椭圆形，无毛，药隔无毛。心皮被绢状毛，子房卵形。果实未见。 花期 10—11 月。

产贵州西部。生于海拔 2000 米的开阔山坡及杂木林内。

本种与须蕊铁线莲 *C. pogonandra* 相

近，异点在于聚伞花序，叶缘有浅齿；与尾叶

铁线莲 *C. urophylla* 亦相近，区别在于植株光滑无毛；萼片与雄蕊近等长，仅边缘有绒毛，其余两面无毛。

12. 平坝铁线莲 图版 27

Clematis clarkeana Lévl. et Vant. in Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. 11: 170. 1902; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50: 545. 1903; Lévl. Fl. Kouy-Tcheou. 332. 1915, et Cat. pl. Yunnan. fig. 56. 1917; Rehd. in Journ.



图 6: 安顺铁线莲 *Clematis anshunensis*

1. 花枝外形; 2. 萼片外面; 3. 雄蕊背面;
4. 雄蕊腹面; 5. 心皮。(陈荣道绘)

11. *Clematis anshunensis* M. Y. Fang, sp. nov.

C. pogonandrae Maxim. affinis, sed differt floribus in cymam dispositis, foliolis margine denticulatis, etiam similis *C. urophyllae* Franch., a qua recedit planta tota glabra, sepalis staminibus fere aequilongis, margine tantum tomentosa excepto utrinque glabris.

贵州 (Kweichow): 清镇 (Chingchen) 县, 破岩大坡, 海拔 1450 米, 1956 年 10 月 12 日, 川黔队 (Exp. Szechwan-Kweichow.) 1836; 郎岱 (Langtai) 县, 1930 年 10 月 30 日, 蒋英 (Y. Tsiang) 9492; 安龙 (Anlung) 县, 海拔 620 米, 1930 年 10 月 22 日, 贵州队 (Exp. Kweichow.) 7473; 安顺 (Anshun) 县, 1935 年 11 月 3 日, 邓世伟 (S. W. Teng) 1523 (模式标本 Typus! 存中国科学院华南植物研究所)。

14. *Clematis subfalcata* Pei in Herb., sp. nov.

C. yunnanensi Franch. affinis, sed foliolis elliptico-lanceolatis vel longe lanceolatis, margine integris vel remote denticulatis, dentibus apice mucronatis, cymis glabris subsessilibus basi bracteis squamiformibus vel filiformibus instructis differt.

云南 (Yunnan): 开远 (Kaiyuan) 县, 马桑箐山, 林下, 花白色, 1934 年 2 月 9 日, 蒋英 (Y. Tsiang) 13117 (模式标本 Typus! 存江苏省植物研究所)。

17. *Clematis connata* DC. var. *bipinnata* M. Y. Fang, var. nov.

A. var. connata foliis bipinnatis, foliolis late lanceolatis margine crenatis, petiolis tortis differt.

四川 (Szechwan): 木里 (Muli) 县, 1937 年 9 月 2 日, 俞德浚 (T. T. Yü) 14149; 冕宁 (Mienning) 县, 登相营, 海拔 2900 米, 1939 年 9 月 21 日, 方文培 (W. P. Fang) 5048 (模式标本 Typus! 存中国科学院植物研究所)。

西藏 (Tibet): 聂拉木 (Nyalam), 樟木林, 2900 米, 1973 年 8 月 14 日, 西藏队 (Exp. Tibet.) 1147。

22. *Clematis pinchuanensis* W. T. Wang et M. Y. Fang sp. nov.

Proxima *C. ranunculoidi* Franch., a qua differt caule robusto erecto toto dense tomentoso; foliis simplicibus late ovatis ad fere orbicularibus saepe 3-lobatis; sepalis intus apice tantum pilosis, ceterum glabris, extus dense tomentosis.

云南 (Yunnan): 宾川 (Pinchuan), 沙子街至关上, 1946 年 12 月 25 日, 刘慎谔 (T. N. Liou) 22249 (模式标本 Typus! 开花标本, 存中国科学院华南植物研究所)。

23. *Clematis ranunculoidea* Franch. var. *cordata* M. Y. Fang, var. nov.

A. var. ranunculoide differt foliis ternatis, foliolis papyraceis cordatis 4—