

边缘全缘或有稀疏刺头状锯齿；聚伞花序，无毛，花序梗极短，具鳞状或线状苞片。

15. 台湾丝瓜花

Clematis morii Hay. Fl. Mont. Formos. 42. 1908, et Ic. pl. Formos. 1. 19, pl. 1. 1911.

木质藤本。茎无毛，有纵条纹。叶对生、轮生，三出复叶；叶片亚革质，卵状披针形或长卵状披针形、顶生小叶片长11厘米，宽3.5厘米，顶端尾状渐尖，基部圆形，有侧裂片，侧裂片顶端钝圆，边缘全缘或有刺头状锯齿，侧脉约5对，在表面平坦，在背面凸起，小叶柄扭曲，长约1厘米；侧生小叶片长卵形，微短，常无裂片，小叶柄长仅3毫米或无柄。花单生于叶腋，花萼钟状，直径1.5厘米，花梗长约3—4厘米，被短柔毛，基部有一对苞片，微被绒毛；萼片4枚，卵圆形，长1.8厘米，宽9毫米，顶有钝尖头，基部微心形，内面暗紫色，外面被短绒毛，平行脉纹开展；雄蕊3—4轮，外轮最长，花丝线形，扁平，长1.3厘米，被长柔毛，花药长2毫米，顶端微凹陷，内轮最短，花丝长7毫米，花药长约3毫米；心皮长约1厘米，有羽毛状的花柱。

产我国台湾中部山区（海拔3000米）。

本种近于毛蕊铁线莲 *C. lasiandra*，但是叶片近于全缘，萼片外面被短绒毛，可以区别。

16. 长花铁线莲（中国高等植物图鉴）

图7




图7：长花铁线莲 *Clematis rehderiana*

1.花枝；2.萼片；3.雄蕊；4.心皮；
5.瘦果。（王兴国绘）