

米,宽0.8—1.5厘米,内面密生柔毛可以区别。

西藏吉隆(青藏队7153)、波密(青藏队1057)的标本,除小叶裂片为卵形外,其他特征与四川标本无差异,现仍归入本种范围内。

43. 黄花铁线莲(东北植物检索表) 透骨草(河北北部) 图15

Clematis intricata Bunge in Mém. Acad. St.-Petersb. Sav. Etr. 2: 75. 1833; Ktagaw. Lineam. Fl. Mansh. 217. 1939; Kom. in Act. Hort. Petrop. 22: 288. 1903; 中国高等植物图鉴 1: 740, 图1480. 1972; 秦岭植物志 1(2): 290. 1974; 东北草本植物志 3: 173, 图版75, 图8. 1975.——*C. orientalis* L. var. *intricata*. (Bunge) Maxim. in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb. 22: 210. 1876.——*C. glauca* Willd. β. *angustifolia* Ledeb. Fl. Ross. 1: 3. 1842; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 4: 190. 1923; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 8: 217. 1939; 北京植物志, 上册: 305. 1962; 河北中药手册 357, 图144. 1970.

草质藤本。茎纤细,多分枝,有细棱,近无毛或有疏短毛。一至二回羽状复叶;小叶有




图15: 黄花铁线莲 *Clematis intricata*
1. 花枝; 2. 萼片内面; 3. 雄蕊外、内面;
4. 心皮。(王兴国绘)

柄,2—3全裂或深裂,浅裂,中间裂片线状披针形、披针形或狭卵形,长1—4.5厘米,宽0.2—1.5厘米,顶端渐尖,基部楔形,全缘或有少数牙齿,两侧裂片较短,下部常2—3浅裂。聚伞花序腋生,通常为3花,有时单花;花序梗较粗,长1.2—3.5厘米,有时极短,疏被柔毛;中间花梗无小苞片,侧生花梗下部有2片对生的小苞片,苞片叶状,较大,全缘或2—3浅裂至全裂;萼片4,黄色,狭卵形或长圆形,顶端尖,长1.2—2.2厘米,宽4—6毫米,两面无毛,偶尔内面有极稀柔毛,外面边缘有短绒毛;花丝线形,有短柔毛,花药无毛。瘦果卵形至椭圆状卵形,扁,长2—3.5毫米,边缘增厚,被柔毛,宿存花柱长3.5—5厘米,被长柔毛。花期6月至7月,果期8月至9月。

分布于青海东部、甘肃南部(海拔1600—2600米)、陕西、山西、河北、辽宁凌源、内蒙古西部和

南部。生山坡、路旁或灌丛中。模式标本采自北京。

在河北北部,本种全草作透骨草收购入药,治慢性风湿性关节炎等症(河北中药手册)。

43b. 变异黄花铁线莲(变种)

Clematis intricata var. *purpurea* Y. Z. Zhao, 内蒙古植物志 2: 369. 1979.
与黄花铁线莲的区别: 花较大,萼片紫色,长约2.5厘米,宽约1厘米;叶较宽,中间裂