

片披针形或椭圆状披针形。

分布于内蒙古大青山哈拉沁沟黄草洼、锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗。生于林下。

44. 粉绿铁线莲(中国高等植物图鉴)

Clematis glauca Willd. Herb. Baumz. 65, t. 4, f. 1. 1796; Ledeb. Fl. Ross. 1; 3. 1842; Krasch. in Fl. URSS 7: 321. 1937; 中国高等植物图鉴 1: 740. 1972.——*C. orientalis* var. *glauca* Maxim. Fl. Tangut. 3. 1889.

草质藤本。茎纤细，有棱。一至二回羽状复叶；小叶有柄，2—3全裂或深裂、浅裂至不裂，中间裂片较大，椭圆形或长圆形、长卵形，长1.5—5厘米，宽1—2厘米，基部圆形或圆楔形，全缘或有少数牙齿，两侧裂片短小。常为单聚伞花序，3花；苞片叶状，全缘或2—3裂；萼片4，黄色，或外面基部带紫红色，长椭圆状卵形，顶端渐尖，长1.3—2厘米，宽5—8毫米，除外面边缘有短绒毛外，其余无毛，瘦果卵形至倒卵形，长约2毫米，宿存花柱长4厘米。花期6月至7月，果期8月至10月。

在我国分布于新疆、青海、甘肃南部(海拔2100—2600米)、陕西、山西(1000—1600米)。生山坡、路边灌丛中。蒙古、苏联中亚及西伯利亚地区西南部也有分布。

本种与黄花铁线莲 *C. intricata*，东方铁线莲 *C. orientalis* 相似，不同在于：本种萼片内面无毛，或偶有极稀疏柔毛，而东方铁线莲萼片内面有柔毛；本种小叶裂片常为椭圆形或长圆形、长卵形，而黄花铁线莲小叶裂片常为线状披针形或披针形、狭卵形，可以区别。

全草入药，可祛风湿，止痒，主治慢性风湿关节炎、关节疼痛；疮疖熬膏外敷；枝叶水煎外洗，可止瘙痒症。

45. 齿叶铁线莲(东北植物检索表) 图 16

Clematis serratifolia Rehd. in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. 248. 1910; Krasch. in Fl. URSS 7: 321. 1937; Kitag. Lineam. Fl. Mansh. 218. 1939; 东北草本植物志 3: 173, 图版 75, 图 4—7, 1975.——*C. orientalis* L. var. *serrata* Maxim. et var. *wilfordi* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb. 9: 211. 1876.——*C. intricata* Bunge var. *wilfordi* (Maxim.) Kom. et var. *serrata* (Maxim.)




图 16: 齿叶铁线莲 *Clematis serratifolia*

1. 部分茎示花和叶；2. 萼片(内面)；3. 雄蕊；
4. 瘦果。(史渭清抄自东北草本植物志)