

52. 准噶尔铁线莲(中国高等植物图鉴) 图 19

Clematis songarica Bunge, Del. Semin. Hort. Dorpat. 8. 1839; Ledeb. Fl. Ross. 1; 2. 1842; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50: 538. 1903; Krasch. in Fl. URSS 7: 316, tab. 20, f. 2. 1937; 中国高等植物图鉴 1: 743, 图 1486. 1972. — *C. gebleriana* Bong. in Bull. Sci. Acad. Sci. St.-Petersb. 8: 338. 1841. — *C. recta* L. ssp. *songarica* (Bunge) Kuntze in Verh. Bot. Ver. Brandenburg. 26: 112. 1885.

直立小灌木或多年生草本,高40—150厘米。枝有棱,带白色,无毛或稍有细柔毛。单叶对生或簇生;叶片薄革质,灰绿色,线形、线状披针形、狭披针形至披针形,长2—8厘米,宽0.2—2厘米,顶端锐尖或钝,基部渐狭成柄,全缘或有锯齿,或向叶基部渐成锯齿状牙齿或为小裂片,两面无毛;叶柄长0.5—3厘米。聚伞花序或圆锥状聚伞花序顶生;花直径2—3厘米;萼片4,开展,白色,长圆状倒卵形至宽倒卵形,长0.5—2厘米,宽0.3—1厘米,顶端常近截形而有凸头或凸尖,外面边缘密生绒毛,内面有短柔毛至近无毛;雄蕊无毛,花丝线形。瘦果略扁,卵形或倒卵形,长3—5毫米,密生白色柔毛,宿存花柱长2—3厘米。花期6月至8月,果期7月至9月。

在我国产新疆。生海拔450—2500米间的山麓前冲积扇、石砾冲积堆、河谷、湿草地或荒山坡。蒙古及苏联中亚地区也有分布。

52b. 蕨叶铁线莲 (中国高等植物图鉴)
(变种) 图 20

Clematis songarica var. *asplenifolia* (Schrenk) Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 33: 56. 1860. — *C. asplenifolia* Schrenk, Enum. pl. Nov. 2: 68. 1842; Krasch. in Fl. URSS 7: 317. 1937; 中国高等植物图鉴 1: 743. 1972. — *C. songarica* var. *intermedia* Trautv. l. c. — *C. boissieriana* Korsh. in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb. 9: 400. 1898. — *C. asplenifolia* var. *boissieriana* (Korsh.) Krasch. in Fl. URSS 7: tab. 20, f. 3. 1937.

与准噶尔铁线莲的区别: 茎中部以下的叶片常为狭针形、长椭圆状披针形至线状披



图 20: 蕨叶铁线莲 *Clematis songarica* var. *asplenifolia*

1. 植株全形; 2. 叶。(韦力生绘)