

针形,长2—8厘米,宽0.4—1.2厘米,基部渐狭成柄,全缘或近基部有缺刻状牙齿或分裂成小裂片;茎中部以上的叶片常羽状全裂,长达15厘米,顶生裂片较大,椭圆状披针形至狭披针形,基部渐狭成柄,上部全缘,向基部有锯齿、牙齿或小裂片,侧生裂片小,对生或互生,疏离,倒卵形、倒楔形或近圆形,有锯齿或全缘;若有一回羽状复叶,小叶片较小,有短柄,有时不等2—3浅裂至羽状分裂,裂片顶端啮齿状。花期7月至8月,果期9月至10月。

产新疆西部。生海拔500—2500米间的山沟、水旁、河谷草地及河滩石砾处。也分布于阿富汗、苏联中亚地区。

本变种与准噶尔铁线莲 *C. songarica* 虽然很接近,且又有中间类型存在,但因本变种茎中部以上叶片常呈羽状全裂,有区别,故作变种处理较为妥当。

53. 披针叶铁线莲(拉汉种子植物名称) 八瓜筋(四川米易)

Clematis lancifolia Bur. et Franch. in Morot, Journ. Bot. 5: 18. 1891; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50: 538. 1903; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 204. 1939; Lauener et Green in Not. Roy. Bot. Gard. 23: 582. 1961.—*C. duclouxii* Lévl. in Rep. Sp. Nov. 7: 97. 1909; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 10: 187. 1929.—*C. iochanica* Ulbr. in Bot. Jahrb. 48: 620. 1913.

直立小灌木。茎圆柱形,有纵条纹,高20—80厘米,小枝有棱,疏生短柔毛或近无毛。单叶对生,常较紧密着生在茎的下半部;叶片革质,披针形、长圆状披针形或卵状披针形,长4—14厘米,宽1—2.5厘米,顶端钝或钝急尖,基部楔形或近圆形,全缘,两面疏生短柔毛或近无毛;叶柄长0.5—5厘米。聚伞花序或总状聚伞花序顶生,有花3—9朵;萼片4—6,开展,白色或外面带淡红色,线状披针形至长椭圆形,长1.5—2厘米,外面边缘有短绒毛,内面无毛;雄蕊无毛,偶有退化雄蕊。瘦果卵形或椭圆形,扁,长约5毫米,有柔毛,宿存花柱长达3厘米。花期7月至8月,果期9月至10月。

分布于云南、四川西部及西南部(海拔1500—1900米)。生山坡林下或草丛中。模式标本采自四川康定。

根有清热解暑、杀菌作用,四川民间用来治口臭、口烂等。

53b. 竹叶铁线莲(变种)


Clematis lancifolia var. *ternata* W. T. Wang et M. C. Chang in Ad-denda.

与披针叶铁线莲的区别:叶为三出复叶。

产四川米易。生海拔1100米的山坡上。

54. 银叶铁线莲(中国高等植物图鉴) 图版44: 1—6

Clematis delavayi Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 33: 360. 1888; Finet



1—6. 银叶铁线莲 *Clematis delavayi* 1. 植株上部; 2. 小叶片(下面); 3. 萼片(外面); 4. 萼片(内面); 5. 雄蕊; 6. 心皮。7. 疏毛银叶铁线莲 *C. delavayi* var. *calvescens* 小叶片(下面)。

et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50: 537. 1903; Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: 325. 1913; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 203. 1939; 中国高等植物图鉴 1: 744, 图 1488. 1972.

近直立小灌木, 高 0.6—1.5 米。茎、小枝、花序梗、花梗及叶柄、叶轴均密生短的绢状毛。茎有棱, 少分枝, 老枝外皮呈纤维状剥落。一回羽状复叶对生, 或数叶簇生, 有 (5—) 7—17 小叶, 茎上部的簇生叶常少于 7; 小叶片卵形、椭圆状卵形、长椭圆形至卵状披针形, 长 0.8—3 (—4) 厘米, 宽 0.4—1.5 (—2) 厘米, 顶端有小尖头, 基部近圆形或楔形, 全缘, 有时有 1—2 缺刻状牙齿或小裂片, 顶生小叶片常有不等 2—3 浅裂至全裂, 上面干时黑色, 沿叶脉或幼时稍有短柔毛, 下面密生短的绢状毛而呈银白色; 无柄或柄长达 0.6 厘米。通常为圆锥状聚伞花序多花, 顶生; 花直径 2—2.5 厘米; 萼片 4—6, 开展, 白色, 通常为长圆状倒卵形, 长 0.8—1.5 厘米, 外面有较密短的绢状毛, 或边缘无毛; 雄蕊无毛。瘦果有绢状毛, 宿存花柱有银白色长柔毛。花期 6 月至 8 月, 果期 10 月。

分布于云南西北部、四川西部。生海拔 2200—3200 米间山地、沟边、河边、路旁以及山谷灌丛中。模式标本采自云南鹤庆。

54b. 疏毛银叶铁线莲(变种) 图版 44: 7

Clematis delavayi var. *calvescens* Schneid. in Bot. Gaz. 63: 517. 1917; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 203. 1939.

与银叶铁线莲的区别: 茎、小枝、花序梗、花梗及叶柄、叶轴有较疏短的绢状毛; 小叶片较薄, 下面有较疏短的绢状毛而不呈银白色。

产云南西北部及四川西南部。生山坡。模式标本采自云南丽江和中甸县之间。

54c. 裂银叶铁线莲(变种)

Clematis delavayi var. *limprichtii* (Ulbr.) M. C. Chang, st. nov. — *C. limprichtii* Ulbr. in Rep. Sp. Nov. Beih. 12: 373. 1922; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 203. 1939.

与银叶铁线莲的区别: 小叶片较小, 披针形、长椭圆形、椭圆形至卵形, 长 0.4—1.5 厘米, 宽 1—5 毫米, 顶端有长尖头, 基部楔形或宽楔形, 边缘除全缘外, 常有 2—3 深裂至全裂; 花单生, 或聚伞花有 3—7 花, 花稍大, 直径 3—4 厘米。与变种刺铁线莲 *C. delavayi* var. *spinescens* 的区别在于后者小叶片为椭圆形至长圆形, 顶端钝或锐尖, 全缘, 偶有 2—3 裂。本变种花期为 6 月至 8 月, 果期 10 月。

分布于四川西部。生谷地、干燥山坡或路边、河旁。模式标本采自四川道孚。

54d. 刺铁线莲(变种) 图版 45

Clematis delavayi var. *spinescens* Balf. f. ex Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. 5(25): 262. 1912; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 203. 1939.

与银叶铁线莲的区别: 茎多分枝, 枝端常呈刺状; 一回羽状复叶有 3—11 小叶, 通常