

约 50 种, 分布于亚洲和欧洲。我国约有以下 14 种、7 变种、1 变型。

56. 太行铁线莲 黑老婆秧(山东), 老牛杆、黑狗筋(江苏) 图版 47

*Clematis kirilowii* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb 22: 210. 1876; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 5. 1886; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 205. 1939. — *C. recta* L. ssp. *kirilowi* (Maxim.) Kuntze in Verh. Bot. Ver. Brand. 26: 116. 1885. — *C. matsumurana* Yabe in Bot. Mag. Tokyo 29: 240. 1915.

木质藤本, 干后常变黑褐色。茎、小枝有短柔毛, 老枝近无毛。一至二回羽状复叶, 有 5—11 小叶或更多, 基部一对或顶生小叶常 2—3 浅裂、全裂至 3 小叶, 中间一对常 2—3 浅裂至深裂, 茎基部一对为三出叶; 小叶片或裂片革质, 卵形至卵圆形, 或长圆形, 长 1.5—7 厘米, 宽 0.5—4 厘米, 顶端钝、锐尖、凸尖或微凹, 基部圆形、截形或楔形, 全缘, 有时裂片或第二回小叶片再分裂, 两面网脉突出, 沿叶脉疏生短柔毛或近无毛。聚伞花序或为总状、圆锥状聚伞花序, 有花 3 至多朵或花单生, 腋生或顶生; 花序梗、花梗有较密短柔毛, 花直径 1.5—2.5 厘米; 萼片 4 或 5—6, 开展, 白色, 倒卵状长圆形, 长 0.8—1.5 厘米, 宽 3—7 毫米, 顶端常呈截形而微凹, 外面有短柔毛, 边缘密生绒毛, 内面无毛; 雄蕊无毛。瘦果卵形至椭圆形, 扁, 长约 5 毫米, 有柔毛, 边缘凸出, 宿存花柱长约 2.5 厘米。花期 6 月至 8 月, 果期 8 月至 9 月。

在我国分布于山西南部及太行山一带(海拔 700—1200 米)、河北(800—1750 米)、山东、河南西部(200 米左右)、安徽东北部及江苏徐州专区。生山坡草地、丛林中或路旁。模式标本采自北京附近。

与秦岭铁线莲 *C. obscura* 的区别在于后者小叶片或裂片纸质, 顶端锐尖或渐尖, 两面网脉不明显; 花较大, 直径 2.5—5 厘米, 萼片顶端尖或钝, 除外面边缘密生绒毛外, 其余无毛。

56b. 狭裂太行铁线莲(变种)

*Clematis kirilowii* var. *chanetii* (Lévl.) Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 205. 1939. — *C. chanetii* Lévl. in Rep. Sp. Nov. 11: 495. 1913; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 10: 188. 1929.

与太行铁线莲的区别: 小叶片或裂片较狭长, 线形、披针形至长椭圆形, 基部常楔形。花期 6 月至 8 月。

在我国分布于山西太行山一带, 河北、河南、山东。生山坡或路旁。模式标本采自河北西部。

56c. 巴山铁线莲(变种)

*Clematis kirilowii* var. *pashanensis* M. C. Chang in Addenda. — *C. chinensis* auct. non Osbeck; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50:



太行铁线莲 *Clematis kirilowii*

1. 部分茎；2. 花序；3. 萼片(外面和里面)；4. 心皮。(史渭清绘)