

60b. 皱叶铁线莲(秦岭植物志)(变种) 革叶铁线莲(中国高等植物图鉴)

Clematis uncinata var. **coriacea** Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. ser. 22: 288. 1915; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 207. 1939; 王文采, 植物分类学报 6(4): 375. 1957; 中国高等植物图鉴 1: 747. 1972; 秦岭植物志 1(2): 294. 1974.——*C. uncinata* auct. non Champ., Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50: 523. 1903, p. p.; Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: 327. 1913, p. p.——*C. leiocarpa* Oliv. in Hooker's Ic. Pl. 16: pl. 1533. 1886; Diels in Bot. Jahrb. 29: 332. 1900.

与柱果铁线莲的区别: 小叶片较厚, 革质, 干后上面微皱, 下面叶脉不明显。花期6月至7月, 果期8月至9月。

分布于四川盆地北缘山区(海拔550—2000米)、甘肃南部(800米左右)、陕西南部(680—1800米)、湖北西部(750—1200米)、湖南西北部。生山坡、山谷林下, 河边、沟旁灌丛中或草丛中。模式标本采自湖北西部。

61. 舟柄铁线莲 图版49


Clematis dilatata Pêi in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 10: 105, f. 15. 1936; Metcalf in Lingn. Sci. Journ. 20: 129, pl. 5. 1941.

木质藤本。茎、枝圆柱形, 有纵条纹, 有柔毛, 后变无毛。一至二回羽状复叶, 有5—13小叶, 通常基部一对以至第二对有3或2小叶; 小叶片革质, 长卵形、卵形、卵圆形或长圆状披针形, 长3—9厘米, 宽1.5—3.5厘米, 顶端锐尖或钝, 有时渐尖, 基部圆形或浅心形, 全缘, 两面无毛, 网脉突出, 下面粉绿色; 叶柄基部扩大而连合, 抱茎, 有时较不明显。圆锥状聚伞花序顶生或腋生, 比叶短; 花序梗、花梗有较密柔毛; 花直径达5.5厘米; 萼片5—6(—7), 开展, 白带红色, 长2—3.5厘米, 宽0.5—1厘米, 倒卵状披针形或长椭圆形, 外面有柔毛, 边缘密生绒毛, 内面有短柔毛。瘦果狭卵形, 扁, 长约5毫米, 有柔毛, 宿存花柱长达3.5厘米。花期5月, 果期6月。

分布于浙江的遂昌、景宁、丽水、云和等县。生山坡林中或山谷溪边。花模式标本采自浙江丽水; 果模式标本采自浙江云和。

62. 圆锥铁线莲(杭州药用植物志) 黄药子(植物名实图考), 小叶力刚、铜威灵、蟹珠眼草(浙江), 铜脚威灵仙

Clematis terniflora DC. Syst. 1: 137. 1818, excl. syn.; DC. Prodr. 1: 3. 1824, excl. syn., sphalm. *C. tenuiflora*; Ohwi in Act. Phytotax. Geobot. 7: 43. 1938; Hara in Journ. Jap. Bot. 50: (5): 155. 1975.——*C. paniculata* Thunb. in Trans. Linn. Soc. 2: 337. 1794, non Gmel. 1791; Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: 330. 1913; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 206. 1939; 中国高等植物图鉴 1: 745, 图1490. 1972; 秦岭植物志 1(2): 292. 1974, p. p.——*C.*

舟柄铁线莲 *Clematis dilatata*

1. 部分茎示花序、叶、叶柄；2. 萼片(外面和里面)；3. 心皮；4. 瘦果；5. 雄蕊(外面和里面)。 (史渭清绘)