

分布于陕西南部、河南西部、山西南部。生海拔 400—1100 米的山坡、山谷、河边及水沟旁。模式标本采自陕西华山。

62c. 辣蓼铁线莲(东北草本植物志)(变种)

*Clematis terniflora* var. *mandshurica* (Rupr.) Ohwi in Act. Phytotax. Geobot. 7; 43. 1938.——*C. mandshurica* Rupr. in Bull. Phys. Math. Acad. Sci. St.-Petersb. 15; 258. 1857; Maxim. Prim. Fl. Amur. 10. 1859; Kom. in Act. Hort. Petrop. 22; 282. 1903; Kraschen. in Fl. URSS 7; 319, t. 20, f. 11. 1937; Kitag. Lineam. Fl. Manshur. 218. 1939; 东北草本植物志 3; 169, 图版 74, 图 1—4. 1975.——*C. recta* auct. non L.; Regel, Tent. Fl. Ussur. 1. 1861; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50; 535. 1903, p. p.——*C. recta* L. var. *mandshurica* (Rupr.) Maxim. in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb. 22; 218. 1876; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23; 7. 1886, quoad specim. shing-king.——*C. terniflora* auct. non DC.; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13; 205. 1939; Tamura in Act. Phytotax. Geobot. 15; 18. 1953.——*C. liaotungensis* Kitag. in Rep. Inst. Sci. Res. Manch. II, 7; 291. 1938.

与圆锥铁线莲的区别：茎和分枝除节上有白色柔毛外，其余无毛或近无毛；小叶片卵形、长卵形或披针状卵形，顶端渐尖或锐尖，很少钝，无微凹，上面无毛，网脉明显，下面近无毛；花序较长而挺直，长可达 25 厘米，花序梗、花梗近无毛或稍有短柔毛，萼片外面除边缘有绒毛外，其余无毛或稍有短柔毛；瘦果较小，长 4—6 毫米，宽 2.5—4 毫米。花期 6 月至 8 月，果期 7 月至 9 月。

在我国分布于山西、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古。生山坡灌丛中、杂木林内或林边。也分布于朝鲜、蒙古、苏联西伯利亚东部。

根有镇痛、利尿作用，治风湿性关节炎、半身不遂、水肿、神经痛、偏头痛、颜面神经麻痹、鱼刺哽喉；叶有抑菌作用；全草可作农药(东北草本植物志)。种子油可制肥皂(辽宁经济植物志)。

62d. 鸳鸯鼻铁线莲(台湾植物志)

*C. terniflora* var. *garanbiensis* (Hay.) M. C. Chang, comb. nov.——*C. garanbiensis* Hay. Ic. pl. Formos. 9; 1. 1920.——*C. terniflora* var. *robusta* auct. non (Carr.) Tamura; 台湾植物志 2; 492. 1976.

与圆锥铁线莲的区别：茎和分枝除节上有白色柔毛外，其余无毛；小叶片卵形或卵圆形，长 1.5—4 厘米，宽 0.8—2.5 厘米(根据现有标本)，顶端锐尖、钝或微凹，有小尖头，两面无毛或稍有短柔毛；花序梗无毛，花梗稍有短柔毛，萼片除外面边缘有绒毛外，其余无毛或稍有短柔毛。

产我国台湾。