

## 63. 陕西铁线莲(秦岭植物志) 武当铁线莲(湖北植物志)

*Clematis shensiensis* W. T. Wang, 植物分类学报 6(4): 378, 图版 59, 图 6. 1957; 秦岭植物志 1(2): 295, 图 252. 1974. — *C. wutangensis* W. T. Wang, 湖北植物志 1: 369. 1976, nom. seminud.

藤本。小茎枝圆柱形,有纵条纹和短柔毛。一回羽复叶,常有5小叶;小叶片纸质,卵形或宽卵形,长2.5—7厘米,宽1.5—5.5厘米,顶端锐尖、短渐尖或钝,基部浅心形或圆形,全缘,上面疏生短柔毛或近无毛,下面密生短柔毛,两面网脉常不明显突出。聚伞花序腋生或顶生,3—9花或花单生,常稍比叶短;花序梗、花梗密生短柔毛;花直径3—5厘米;萼片4,或5—6,开展,白色,倒披针形至倒卵状长圆形,长1—2.5厘米,宽约5毫米,外面边缘密生绒毛,中间为短柔毛;雄蕊无毛。瘦果卵形,扁,长5—8毫米,宽3—5毫米,宿存花柱长达4厘米,有金黄色长柔毛。花期5月至6月,果期8月至9月。

分布于陕西南部(海拔1200米左右)、湖北西部、河南南部、山西南部。生山坡灌丛中、山沟边或石壁上。模式标本采自陕西终南山。

## 64. 五叶铁线莲 柳叶见血飞、辣药(云南药用植物名录) 图版 51

*Clematis quinquefoliolata* Hutch. in Gard. Chron. ser. 3, 41: 3. 1907; Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: 328. 1913; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 208. 1939.

木质藤本。茎、枝有纵条纹,小枝有短柔毛,后变无毛。一回羽状复叶,有5小叶;小叶片薄革质,长圆状披针形、卵状披针形至长卵形或卵形,长4—9厘米,宽1—3.5厘米,顶端凸尖至渐尖,基部圆形至浅心形,或为楔形,全缘,两面无毛,或下面稍有柔毛。聚伞花序或总状、圆锥状聚伞花序,腋生或顶生,有3—10余朵花;花序梗、花梗疏生短柔毛;萼片4,开展,白色,近长圆形或倒卵状椭圆形,长1—2厘米,外面有短柔毛,边缘密生绒毛,内面无毛。瘦果卵形或椭圆形,扁,长约5毫米,有柔毛,宿存花柱长达6厘米。花期6月至8月,果期7月至10月。

分布于云南嵩明(1880米)、四川、贵州、湖北西部(1000—1600米)、湖南。生山坡、路旁灌丛中或水沟边。模式标本采自湖北。

根药用能祛风湿、温中理气、散瘀止痛,治腹痛吐泻、虚寒胃痛、月经不调、痛经、干血癆、风湿麻木、关节疼痛、跌打损伤、偏头痛、神经痛等(云南药用植物名录)。

采自云南嵩明的 No. 51338 二分标本(存中国科学院昆明植物研究所),除小叶片顶端渐尖、基本楔形外,其余特征与湖北、四川的标本基本相似,因标本少,故仍作同一种处理。

## 65. 毛柱铁线莲(中国高等植物图鉴) 吹风藤、老虎须藤(广西上思) 图 22

*Clematis meyeniana* Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. Misc. 19 (suppl. 1): 297. 1843; Benth. Fl. Hongk. 6. 1861; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb.



五叶铁线莲 *Clematis quinquefoliolata*

1. 部分茎示果序和叶; 2. 部分茎示花序; 3. 萼片(外面和内面); 4. 雄蕊; 5. 心皮; 6. 柱头; 7. 瘦果。