

与毛柱铁线莲的区别：小叶片两面皱纹密。

在我国分布于云南河口(海拔160米)、广西、广东(60—1300米)。生丘陵、山地、山谷、路边、沟旁的林边、林中或灌丛中。老挝、越南也有分布。模式标本采自广东海南。

全株药用,能清热利尿、通经活络;主治水肿、乳汁不通、风湿骨痛。

66. 山木通(植物名实图考) 大叶光板力刚、过山照、九里花、老虎须、老虎毛、雪球藤(浙江) 图23

Clematis finetiana Lévl. et Vant. in Bull. Soc. Bot. Fr. 51: 219. 1904; Lévl. Fl. Kouy-Tcheou 332. 1915; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 207. 1939; 中国高等植物图鉴 1: 748, 图1495. 1972.——*C. pavoliniana* Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. ser. 17: 270. 1910; Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: 328. 1913; Chun in Sunyatsenia 1: 231. 1934; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 18: 256. 1937; 江苏南部种子植物手册 284, 图448. 1959.——*C. meyeniana* Walp. var. *pavoliniana* (Pamp.) Sprag. in Kew Bull. 1916: 47. 1916.




图23: 山木通 *Clematis finetiana*

1.部分茎示花序和叶; 2.雄蕊;
3.心皮。(王兴国绘)。

木质藤本,无毛。茎圆柱形,有纵条纹,小枝有棱。三出复叶,基部有时为单叶;小叶片薄革质或革质,卵状披针形、狭卵形至卵形,长3—9(—13)厘米,宽1.5—3.5(—5.5)厘米,顶端锐尖至渐尖,基部圆形、浅心形或斜肾形,全缘,两面无毛。花常单生,或为聚伞花序、总状聚伞花序,腋生或顶生,有1—3(—7)花,少数7朵以上而成圆锥状聚伞花序,通常比叶长或近等长;在叶腋分枝处常有多数长三角形至三角形宿存芽鳞,长5—8毫米;苞片小,钻形,有时下部苞片为宽线形至三角状披针形,顶端3裂;萼片4(—6),开展,白色,狭椭圆形或披针形,长1—1.8(—2.5)厘米,外面边缘密生短绒毛;雄蕊无毛,药隔明显。瘦果镰刀状狭卵形,长约5毫米,有柔毛,宿存花柱长达3厘米,有黄褐色长柔毛。花期4月至6月,果期7月至11月。

分布于云南、四川、贵州(700—1200米)、河南鸡公山、湖北、湖南(300—1200

米)、广东(200—800米)、广西、福建(400—1000米)、江西(100—700米)、浙江(120—1200米)、江苏南部、安徽淮河以南(100—900米)。生山坡疏林、溪边、路旁灌丛中及山

谷石缝中。模式标本采自贵州平伐(贵定南)。

全株清热解毒、止痛、活血、利尿,治感冒、膀胱炎、尿道炎、跌打劳伤;花可治扁桃腺炎、咽喉炎(云南药用植物名录)。又能祛风利湿、活血解毒,治风湿关节肿痛、肠胃炎、疟疾、乳痛、牙疳、目生星翳(江苏新医学院,中药大辞典)。

67. 浙江山木通 图 24

Clematis chekiangensis Péri in Contr.

Biol. Lab. Sci. Soc. China 10: 105. 1936.

藤本。茎圆柱形,有纵条纹,小枝疏生短柔毛,后变无毛。三出复叶,茎基部或上部有单叶;小叶片卵状披针形至长椭圆状披针形,长4—12厘米,宽2—5厘米,顶端短渐尖至渐尖,基部浅心形或圆形,全缘,两面无毛。圆锥状聚伞花序多花,顶生或腋生;苞片大,叶状,卵形至披针状卵形,有柄;花直径约1.5厘米;萼片4,开展,白色,卵形,长0.8—1厘米,外面边缘密生短绒毛,中间有短柔毛,内面无毛;雄蕊无毛。瘦果有柔毛(未成熟)。花期6月。

产浙江庆元应岭山。生山坡林中。

与山木通 *C. finetiana* 区别在于本种为圆锥状聚伞花序多花;苞片大,叶状,有柄,易识别。

68. 小木通(植物名实图考) 蓑衣藤(秦岭、巴山),川木通(四川筠连) 图版 52

Clematis armandii Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, ser. 2, 8: 184. 1885; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50: 526. 1903; Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. ser. 17: 269. 1910; Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: 326. 1913; Péri in Sinensia 6: 388. 1935; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 208. 1939; 中国高等植物图鉴 1: 748, 图 1496. 1972; 秦岭植物志 1(2): 294. 1974. — *C. biondiana* Pavol. in Bull. Soc. Tosc. Ort. 32: 285. 1907; Péri in Sinensia 6: 389. 1935. — *C. ornithopus* Ulbr. in Rep. Sp. Nov. Beih. 12: 375. 1922. — *C. armandii* var. *biondiana* (Pavol.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. 20: 90. 1939. — *C. armandii* f. *farquhariana* Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: 327. 1913; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 208. 1939.

木质藤本,高达6米。茎圆柱形,有纵条纹,小枝有棱,有白色短柔毛,后脱落。三出复叶;小叶片革质,卵状披针形、长椭圆状卵形至卵形,长4—12(—16)厘米,宽2—5(—8)




图 24: 浙江山木通 *Clematis chekiangensis*

1. 植株; 2. 萼片外面; 3. 萼片内面;
4. 雄蕊; 5. 心皮; 6. 瘦果。