

稍有柔毛,其他特征基本一致,且有过渡类型,故作同一种处理。

72b. 长药裂叶铁线莲(变种) 图版 55

*Clematis parviloba* var. *tenuipes* (W. T. Wang) C. T. Ting, st. nov.

—*C. tenuipes* W. T. Wang, 植物分类学报 6(4): 377. 1957.

与裂叶铁线莲区别: 花单生,或聚伞花序有3—5花;花较大,直径3—5.5厘米,萼片长1.5—3厘米;花药较长,长2—3.5毫米。花期4月至5月。

产云南东部及四川。生海拔800—1200米间的山坡林中或林边。模式标本采自云南富宁。

73. 厚萼铁线莲

*Clematis wissmanniana* Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 212.

1939. —*C. gratopsis* W. T. Wang var. *integriloba* W. T. Wang, 植物分类学报 6(4): 386. 1957.



图 25: 鼎湖铁线莲 *Clematis tinghuensis*

1. 植株一部分; 2. 心皮。(陈荣道绘)

藤本。枝有棱,以及和叶柄、花序梗、花梗均密生贴伏短柔毛。一至二回羽状复叶,有5—15小叶,基部二对常2—3裂至3小叶,茎上部有时为三出叶;小叶片或裂片卵形、长卵形或卵状披针形,长2—8厘米,宽1—3厘米,顶端锐尖至渐尖,有时钝,基部圆形,常全缘,或有粗锯齿,两面密生贴伏短柔毛,下面尤密。聚伞花序或圆锥状聚伞花序,3至多花,腋生或顶生,常与叶近等长;花梗上小苞片显著,卵形或椭圆形;花直径2—3.5厘米;萼片4,开展,白色,厚,椭圆形、长圆形或倒卵形,长1—2厘米,宽0.4—1厘米,顶端钝或近圆形,外面密生绢状毛,内面无毛;花药长1.5—2毫米,花丝比花药长4—6倍;子房有柔毛。

产云南元江、蒙自。生海拔1200—1800米间的山坡、路边灌丛中或疏林中。模式标本采自云南元江。

本种近似裂叶铁线莲 *C. parviloba*, 但后者枝、叶柄、花序梗、花梗有较疏短柔毛;萼片较长而薄,近长圆形至狭倒卵形,顶端尖,外面毛较疏。