

楔形,边缘疏生粗锯齿或牙齿,有时3裂,两面近无毛或疏生短柔毛。圆锥状聚伞花序腋生或顶生,常比叶短;花梗长1—1.5厘米,有短柔毛;花直径1.5—2厘米;萼片4,开展,白色,狭倒卵形,长约8毫米,两面均有短柔毛,内面较疏或近无毛;雄蕊无毛,花药长2—2.5毫米。瘦果卵形,长约3毫米,宽约2毫米,密生柔毛,宿存花柱长1.5—2(—3)厘米。花期7月至9月,果期9月至10月。

在我国分布于西藏东部(海拔2500—2700米)、云南(1800—3200米)、四川(1600—2800米)、甘肃、青海东部、宁夏(贺兰山,1500—2100米)、陕西、河南、湖南、浙江(金华、杭州)、江苏、山西、河北(460—2600米)、内蒙古和东北。朝鲜、蒙古、苏联远东地区及日本也有。生山地灌丛或疏林中。模式标本采自河北省北部(从北京到原热河省之间)。

藤茎入药,清热利尿、通乳、消食、通便;主治尿道感染、尿频、尿道痛,心烦尿赤、口舌生疮、腹中胀满、大便秘结、乳汁不通(全国中草药汇编)。

本种与毛果扬子铁线莲 *C. ganpiniana* var. *tenuisepala* 区别在于后者花梗较长,

长1.5—6厘米,花序较疏展;萼片干时变褐色至黑色;花药较短,长1—2毫米;瘦果较大,长约5毫米,宽约3毫米。

78. 台湾铁线莲

Clematis taiwaniana Hay. in Journ.

Coll. Sci. Univ. Tokyo 30 (1): 17. 1911; et Ic. pl. Formos. 1: 23, pl. 4. 1911. — *C. gouriana* auct. non Roxb; 台湾植物志 2: 484. 1976.

草质藤本。茎、枝、叶柄、花序梗、花梗均密生短柔毛。三出复叶、一回羽状复叶至二回三出复叶;小叶片纸质,卵形、宽卵形或披针形,长2—9厘米,宽1—5厘米,顶端渐尖,基部浅心形或圆形,常3裂,边缘有粗钝锯齿,两面有贴伏短柔毛,下面密。圆锥状聚伞花序腋生或顶生,多花,常与叶近等长;花小,直径约1.5厘米;萼片4,开展,白色,狭倒卵形,长约8毫米,两面有短柔毛,外面边缘密



图 27: 细木通 *Clematis kerriana*

1. 部分茎示花序和叶; 2. 萼片(外面和里面);

3. 雄蕊; 4. 叶片(上、下面); 5. 心皮。

生短绒毛;雄蕊无毛。瘦果小,卵形,长约2毫米,宽约1毫米,有柔毛,宿存花柱长达3厘米。花期6月至8月,果期8月。

产我国台湾。

79. 细木通(云南药用植物名录) 小木通(云南) 图 27