

楔形,边缘疏生粗锯齿或牙齿,有时3裂,两面近无毛或疏生短柔毛。圆锥状聚伞花序腋生或顶生,常比叶短;花梗长1—1.5厘米,有短柔毛;花直径1.5—2厘米;萼片4,开展,白色,狭倒卵形,长约8毫米,两面均有短柔毛,内面较疏或近无毛;雄蕊无毛,花药长2—2.5毫米。瘦果卵形,长约3毫米,宽约2毫米,密生柔毛,宿存花柱长1.5—2(—3)厘米。花期7月至9月,果期9月至10月。

在我国分布于西藏东部(海拔2500—2700米)、云南(1800—3200米)、四川(1600—2800米)、甘肃、青海东部、宁夏(贺兰山,1500—2100米)、陕西、河南、湖南、浙江(金华、杭州)、江苏、山西、河北(460—2600米)、内蒙古和东北。朝鲜、蒙古、苏联远东地区及日本也有。生山地灌丛或疏林中。模式标本采自河北省北部(从北京到原热河省之间)。

藤茎入药,清热利尿、通乳、消食、通便;主治尿道感染、尿频、尿道痛,心烦尿赤、口舌生疮、腹中胀满、大便秘结、乳汁不通(全国中草药汇编)。

本种与毛果扬子铁线莲 *C. ganpiniana* var. *tenuisepala* 区别在于后者花梗较长,

长1.5—6厘米,花序较疏展;萼片干时变褐色至黑色;花药较短,长1—2毫米;瘦果较大,长约5毫米,宽约3毫米。

78. 台湾铁线莲

Clematis taiwaniana Hay. in Journ.

Coll. Sci. Univ. Tokyo 30 (1): 17. 1911; et Ic. pl. Formos. 1: 23, pl. 4. 1911. — *C. gouriana* auct. non Roxb; 台湾植物志 2: 484. 1976.

草质藤本。茎、枝、叶柄、花序梗、花梗均密生短柔毛。三出复叶、一回羽状复叶至二回三出复叶;小叶片纸质,卵形、宽卵形或披针形,长2—9厘米,宽1—5厘米,顶端渐尖,基部浅心形或圆形,常3裂,边缘有粗钝锯齿,两面有贴伏短柔毛,下面密。圆锥状聚伞花序腋生或顶生,多花,常与叶近等长;花小,直径约1.5厘米;萼片4,开展,白色,狭倒卵形,长约8毫米,两面有短柔毛,外面边缘密



图 27: 细木通 *Clematis kerriana*

1. 部分茎示花序和叶; 2. 萼片(外面和里面);

3. 雄蕊; 4. 叶片(上、下面); 5. 心皮。

生短绒毛;雄蕊无毛。瘦果小,卵形,长约2毫米,宽约1毫米,有柔毛,宿存花柱长达3厘米。花期6月至8月,果期8月。

产我国台湾。

79. 细木通(云南药用植物名录) 小木通(云南) 图 27

Clematis kerriana Drumm. et Craib in Kew Bull. 1914: 122. 1914, Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 213. 1939.—*C. laxipaniculata* Pêi in Sinensia 7: 473, f. 1. 1936.

藤本。茎、小枝、叶柄及花序梗、花梗均密生淡黄褐色短柔毛。一至二回羽状复叶，有5—21小叶，茎上部有时为三出叶；小叶片卵形至披针形，长2—7(—11)厘米，宽1—3.5(—5)厘米，顶端渐尖或锐尖，基部圆形，上面疏生短柔毛或近无毛，下面密生短柔毛，全缘，偶尔2—3浅裂或有1—2个小牙齿。圆锥状聚伞花序腋生或顶生；萼片4，开展，白色，近长圆形或狭倒卵形，长5—8毫米，两面密生短柔毛；雄蕊无毛。瘦果纺锤形至狭卵形，不扁，有柔毛；宿存花柱长约2.5厘米。花期11月至第二年1月，果期2月至4月。

分布于我国云南西部和南部。生海拔450—1900米的山坡、路边、沟旁灌丛中或林边。泰国也有分布。

根有利尿、通经作用，治疟疾、麻疯(云南药用植物名录)。

80. 小囊衣藤(中药大辞典) 图版59

Clematis gouriana Roxb. ex DC. Syst. 1: 138. 1818; DC. Prodr. 1: 3. 1824; Roxb. Fl. Ind. 2: 670. 1832; Hook. f. et Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 4. 1872; Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: 339. 1913; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 10: 188. 1929, et 17: 318. 1936; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 213. 1939.—*C. vitalba* L. ssp. *α. gouriana* (Roxb.) Kuntze in Verh. Bot. Ver. Brand. 26: 100. 1885.—*C. vitalba* L. var. *micrantha* Lévl. et Vant. in Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. 11 (152): 167. 1902.—*C. vitalba* L. *β. gouriana* (Roxb.) Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50: 532. 1903, p. p.—*C. martini* Lévl. in Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. 17(210—211): ii. 1907, et Fl. Kouy-Tcheou 333. 1915.

藤本。一回羽状复叶，有5小叶，有时3或7，偶尔基部一对2—3小叶；小叶片纸质，卵形、长卵形至披针形，长(4—)7—11厘米，宽(1.5—)3—5厘米，顶端渐尖或长渐尖，基部圆形或浅心形，常全缘，偶尔疏生锯齿状牙齿，两面无毛或近无毛，有时下面疏生短柔毛。圆锥状聚伞花序多花；花序梗、花梗密生短柔毛；萼片4，开展，白色，椭圆形或倒卵形，长5—9毫米，顶端钝，两面无短柔毛；雄蕊无毛；子房有柔毛。瘦果纺锤形或狭卵形，不扁，顶端渐尖，有柔毛，长3—5毫米，宿存花柱长达3厘米。花期9月至10月，果期11月至12月。

在我国分布于云南、贵州(海拔700—1600米)、四川(600—1800米)、湖南西部、湖北西部(120—1200米)、广西(50—1000米)、广东。生山坡、山谷灌丛中或沟边、路旁。从喜马拉雅经印度、缅甸，一直分布到菲律宾。

茎和根药用，有行气活血、祛风湿、止痛作用，治跌打损伤、瘀滞疼痛、风湿性筋骨痛、