

Clematis kerriana Drumm. et Craib in Kew Bull. 1914: 122. 1914, Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 213. 1939.—*C. laxipaniculata* Pêi in Sinensia 7: 473, f. 1. 1936.

藤本。茎、小枝、叶柄及花序梗、花梗均密生淡黄褐色短柔毛。一至二回羽状复叶，有5—21小叶，茎上部有时为三出叶；小叶片卵形至披针形，长2—7(—11)厘米，宽1—3.5(—5)厘米，顶端渐尖或锐尖，基部圆形，上面疏生短柔毛或近无毛，下面密生短柔毛，全缘，偶尔2—3浅裂或有1—2个小牙齿。圆锥状聚伞花序腋生或顶生；萼片4，开展，白色，近长圆形或狭倒卵形，长5—8毫米，两面密生短柔毛；雄蕊无毛。瘦果纺锤形至狭卵形，不扁，有柔毛；宿存花柱长约2.5厘米。花期11月至第二年1月，果期2月至4月。

分布于我国云南西部和南部。生海拔450—1900米的山坡、路边、沟旁灌丛中或林边。泰国也有分布。

根有利尿、通经作用，治疟疾、麻疯(云南药用植物名录)。


80. 小囊衣藤(中药大辞典) 图版59

Clematis gouriana Roxb. ex DC. Syst. 1: 138. 1818; DC. Prodr. 1: 3. 1824; Roxb. Fl. Ind. 2: 670. 1832; Hook. f. et Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 4. 1872; Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: 339. 1913; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 10: 188. 1929, et 17: 318. 1936; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 213. 1939.—*C. vitalba* L. ssp. *α. gouriana* (Roxb.) Kuntze in Verh. Bot. Ver. Brand. 26: 100. 1885.—*C. vitalba* L. var. *micrantha* Lévl. et Vant. in Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. 11 (152): 167. 1902.—*C. vitalba* L. *β. gouriana* (Roxb.) Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50: 532. 1903, p. p.—*C. martini* Lévl. in Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. 17(210—211): ii. 1907, et Fl. Kouy-Tcheou 333. 1915.

藤本。一回羽状复叶，有5小叶，有时3或7，偶尔基部一对2—3小叶；小叶片纸质，卵形、长卵形至披针形，长(4—)7—11厘米，宽(1.5—)3—5厘米，顶端渐尖或长渐尖，基部圆形或浅心形，常全缘，偶尔疏生锯齿状牙齿，两面无毛或近无毛，有时下面疏生短柔毛。圆锥状聚伞花序多花；花序梗、花梗密生短柔毛；萼片4，开展，白色，椭圆形或倒卵形，长5—9毫米，顶端钝，两面无毛；雄蕊无毛；子房有柔毛。瘦果纺锤形或狭卵形，不扁，顶端渐尖，有柔毛，长3—5毫米，宿存花柱长达3厘米。花期9月至10月，果期11月至12月。

在我国分布于云南、贵州(海拔700—1600米)、四川(600—1800米)、湖南西部、湖北西部(120—1200米)、广西(50—1000米)、广东。生山坡、山谷灌丛中或沟边、路旁。从喜马拉雅经印度、缅甸，一直分布到菲律宾。

茎和根药用，有行气活血、祛风湿、止痛作用，治跌打损伤、瘀滞疼痛、风湿性筋骨痛、



小裴衣藤 *Clematis gouriana*
1. 部分茎示果序和叶; 2. 瘦果。(史渭清绘)

肢体麻木等(江苏新医学院“中药大辞典”)。

本种与毛果铁线莲 *C. peterae* var. *trichocarpa* 的区别在于后者花序梗基部常有一对叶状苞片,瘦果卵形,稍扁,小叶片顶端常锐尖或短渐尖,边缘常疏生1至多个锯齿状牙齿,下面疏生短柔毛。而与钝萼铁线莲 *C. peterae* 的区别,除了后者具有上述变种特征外,且子房、瘦果无毛。

81. 女萎(中国植物图鉴) 百根草(福建),花木通、风藤、白棉纱、一把抓(浙江) 图 28

Clematis apiifolia DC. Syst. 1: 149. 1818; Prodr. 1: 6. 1824; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb. 22: 218. 1876; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 2. 1886; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50: 531. 1903, excl. specim. Kweichow.; Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: 336. 1913; Péi in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 10: 103. 1936; Hand-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 213. 1939; 江苏南部种子植物手册 284, 图 449. 1959; 中国高等植物图鉴 1: 751, 图 1501. 1972.

藤本。小枝和花序梗、花梗密生贴伏短柔毛。三出复叶,连叶柄长5—17厘米,叶柄长3—7厘米;小叶片卵形或宽卵形,长2.5—8厘米,宽1.5—7厘米,常有不明显3浅裂,边缘有锯齿,上面疏生贴伏短柔毛或无毛,下面通常疏生短柔毛或仅沿叶脉较密。圆锥状聚伞花序多花;花直径约1.5厘米;萼片4,开展,白色,狭倒卵形,长约8毫米,两面有短柔毛,外面较密;雄蕊无毛,花丝比花药长5倍。瘦果纺锤形或狭卵形,长3—5毫米,顶端渐尖,不扁,有柔毛,宿存花柱长约1.5厘米。花期7月至9月,果期9月至10月。




图 28: 女萎 *Clematis apiifolia*

1. 植株一部分; 2. 雄蕊; 3. 心皮; 4. 萼片; 5. 瘦果。(王兴国绘)

在我国分布江西、福建、浙江(海拔170—1000米)、江苏南部(150—250米)、安徽大别山以南。生山野林边。朝鲜、日本也有。

根、茎藤或全株入药,能消炎消肿、利尿通乳,主治肠炎、痢疾、甲状腺肿大、风湿关节痛、尿路感染,乳汁不下(全国中草药汇编,下册)。

81b. 钝齿铁线莲(中国高等植物图鉴)(变种) 川木通(全国中草药汇编)

Clematis apiifolia var. *obtusidentata* Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: