

肢体麻木等(江苏新医学院“中药大辞典”)。

本种与毛果铁线莲 *C. peterae* var. *trichocarpa* 的区别在于后者花序梗基部常有一对叶状苞片,瘦果卵形,稍扁,小叶片顶端常锐尖或短渐尖,边缘常疏生1至多个锯齿状牙齿,下面疏生短柔毛。而与钝萼铁线莲 *C. peterae* 的区别,除了后者具有上述变种特征外,且子房、瘦果无毛。

81. 女萎(中国植物图鉴) 百根草(福建),花木通、风藤、白棉纱、一把抓(浙江) 图 28

*Clematis apiifolia* DC. Syst. 1: 149. 1818; Prodr. 1: 6. 1824; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb. 22: 218. 1876; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 2. 1886; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50: 531. 1903, excl. specim. Kweichow.; Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: 336. 1913; Péi in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 10: 103. 1936; Hand-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 213. 1939; 江苏南部种子植物手册 284, 图 449. 1959; 中国高等植物图鉴 1: 751, 图 1501. 1972.

藤本。小枝和花序梗、花梗密生贴伏短柔毛。三出复叶,连叶柄长5—17厘米,叶柄长3—7厘米;小叶片卵形或宽卵形,长2.5—8厘米,宽1.5—7厘米,常有不明显3浅裂,边缘有锯齿,上面疏生贴伏短柔毛或无毛,下面通常疏生短柔毛或仅沿叶脉较密。圆锥状聚伞花序多花;花直径约1.5厘米;萼片4,开展,白色,狭倒卵形,长约8毫米,两面有短柔毛,外面较密;雄蕊无毛,花丝比花药长5倍。瘦果纺锤形或狭卵形,长3—5毫米,顶端渐尖,不扁,有柔毛,宿存花柱长约1.5厘米。花期7月至9月,果期9月至10月。




图 28: 女萎 *Clematis apiifolia*

1. 植株一部分; 2. 雄蕊; 3. 心皮; 4. 萼片; 5. 瘦果。(王兴国绘)

在我国分布江西、福建、浙江(海拔170—1000米)、江苏南部(150—250米)、安徽大别山以南。生山野林边。朝鲜、日本也有。

根、茎藤或全株入药,能消炎消肿、利尿通乳,主治肠炎、痢疾、甲状腺肿大、风湿关节痛、尿路感染,乳汁不下(全国中草药汇编,下册)。

81b. 钝齿铁线莲(中国高等植物图鉴)(变种) 川木通(全国中草药汇编)

*Clematis apiifolia* var. *obtusidentata* Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: