

336. 1913; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 213. 1939; Péi in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 10: 103. 1936, et in Sunyatsenia 4: 164. 1940; 江苏南部种子植物手册 285. 1959.——*C. obtusidentata* (Rehd. et Wils.) Hj. Eichler in Bibl. Bot. Heft 124: 24. 1958; 中国高等植物图鉴 1: 751. 1972; 秦岭植物志 1(2): 300. 1974.; 湖北植物志 1: 372, 图 525. 1976.

与女娄的区别：小叶片较大，长5—13厘米，宽3—9厘米，通常下面密生短柔毛，边缘有少数钝牙齿。

分布于云南(海拔1550—1700米)、四川(800—2300米)、甘肃和陕西南部(700—1600米)、贵州(400—2000米)、广西北部(600—1100米)、广东北部、湖南、湖北、江西(400—1200米)、浙江、江苏南部、安徽大别山以南(500—800米)。生山坡林中或沟边。模式标本采自湖北巴东。

茎药用，治尿路感染、小便不利、肾炎水肿、闭经、乳汁不通。

82. 钝萼铁线莲(中国高等植物图鉴) 疏齿铁线莲(拉汉种子植物名称)，木通藤、小木通、风藤草、山棉花、细木通(云南药用植物名录)，线木通、柴木通(湖北) 图 29




图 29: 钝萼铁线莲 *Clematis peterae*

1. 部分茎上花序和叶; 2. 萼片(内面);
3. 雄蕊; 4. 心皮; 5. 瘦果。(王兴国画)

Clematis peterae Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 213. 1939; 王文采, 植物分类学报 6(4): 380. 1957; 中国高等植物图鉴 1: 751, 图 1502. 1972; 秦岭植物志 1(2): 298. 图 256. 1974.——*C. vitalba* L. var. *microcarpa* Franch. pl. Delav. 4. 1889.——*C. vitalba* β. *gouriana* Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50: 532. 1903, p. p.——*C. gouriana* Roxb. var. *finetii* Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: 339. 1913; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 321. 1931; Péi in Sinensia 7: 472. 1936, non *C. finetiana* Lévl. et Vant. 1904.

藤本。一回羽状复叶，有5小叶，偶尔基部一对为3小叶；小叶片卵形或长卵形，少数卵状披针形，长(2—)3—9厘米，宽(1—)2—

4.5厘米，顶端常锐尖或短渐尖，少数长渐尖，基部圆形或浅心形，边缘疏生一至数个以至多个锯齿状牙齿或全缘，两面疏生短柔毛至近无毛。圆锥状聚伞花序多花；花序梗、花梗密生短柔毛，花序梗基部常有1对叶状苞片；花直径1.5—2厘米；萼片4，开展，白色，

倒卵形至椭圆形,长0.7—1.1厘米,顶端钝,两面有短柔毛,外面边缘密生短绒毛;雄蕊无毛;子房无毛。瘦果卵形,稍扁平,无毛或近花柱处稍有柔毛,长约4毫米,宿存花柱长达3厘米。花期6月至8月,果期9月至12月。

分布于云南(海拔1650—3400米)、贵州(1300—1700米)、四川(600—3400米)、湖北西部(340—2300米)、甘肃南部(1100—2200米)、陕西南部(680—1400米)、河南西部和南部、山西南部(800—1650米)、河北南部。生山坡、沟边什木林中。模式标本采自湖北西部。

全株入药,能清热、利尿、止痛,治湿热淋病、小便不通、水肿、膀胱炎、肾盂肾炎、脚气水肿、闭经、头痛;外用治风湿性关节炎(云南药用植物名录)。

本种与小蓼衣藤 *C. gouriana* 区别在于后者花序梗基部通常无一对叶状苞片;瘦果为纺锤形或狭卵形,不扁,有柔毛;小叶片顶端渐尖或长渐尖,全缘,偶有锯齿状牙齿,两面近无毛,有时下面疏生短柔毛。

82b. 毛叶钝萼铁线莲(变种)

Clematis peterae var. *mollis* W. T. Wang, 植物分类学报 6(4): 382. 1957.

与钝萼铁线莲的区别:小叶片两面密生绢状短柔毛,下面更密。

分布于我国云南西部。模式标本采自云南宾川。

82c. 毛果铁线莲(中国高等植物图鉴)(变种) 大木通 (江苏南部种子植物手册)

Clematis peterae var. *trichocarpa* W. T. Wang, 植物分类学报 6(4): 381. 1957; 中国高等植物图鉴 1: 751. 1972; 秦岭植物志 1(2): 298. 1974——*C. gouriana* auct. non Roxb.; 江苏南部种子植物手册 286, 图 452. 1959; 湖北植物志 1: 370. 1976, quoad f. 522.

与钝萼铁线莲的区别:子房和瘦果有柔毛。

分布于四川(海拔600—2400米)、甘肃南部(900—1800米)、陕西南部(700—1900米)、河南西部和南部(600—1120米)、湖北、湖南、江西、浙江北部、江苏、安徽淮河以南。生山坡、山谷、溪边灌丛中或山脚路边。模式标本采自陕西山阳。

83. 粗齿铁线莲(中国高等植物图鉴) 大木通(植物名实图考), 银叶铁线莲(秦岭植物志), 大蓼衣藤、白头公公(秦岭), 小木通(四川), 线木通(湖北巴东) 图 30




图 30: 粗齿铁线莲 *Clematis argentea*

1. 植株一部分; 2. 萼片内面;
3. 雄蕊; 4. 瘦果。(王兴国绘)