

在我国云南、浙江有野生,其余各地园艺上有栽培。野生于海拔高达1700米的山坡、溪边及灌丛中,喜阴湿环境。

93. 短柱铁线莲(中国高等植物图鉴) 图版 69

Clematis cadmia Buch.-Ham. ex Wall. Cat. 4699. 1832; Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 5. 1855; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 198. 1939; 中国高等植物图鉴 1: 742, 图 1484. 1972.——*C. stronachii* Hance in Journ. Bot. 16: 103. 1878.——*C. hakonensis* auct. non Franch. et Sav., Courtois in Mem. Hist. Nat. Chin. 6: 26, t. 7. 1920.——*C. bracteata* (Roxb.) Kurz in Journ. As. Soc. Beng. 43(2): 43. 1784.——*Thalictrum bracteata* Roxb. Fl. Ind. ed. 2, 2: 671. 1832.

细柔多年生草本,高约1米。根粗壮,深棕色,有多数须根。茎圆柱形,幼时浅黄色,老后深棕色或紫红色,有六条明显的纵纹,被稀疏开展的柔毛。二回三出复叶或羽状复叶,连叶柄长达12厘米,被开展的疏柔毛或近于无毛;小叶片狭卵形或椭圆状披针形,长2—5厘米,宽1—2厘米,顶端钝尖,基部楔形,边缘全缘,或有深或浅的分裂,仅中脉上被疏柔毛,其余无毛;小叶柄不明显;叶柄长2—3厘米。单花腋生;花梗细瘦,长约7—10厘米,被开展的疏柔毛,在上部较密,中下部有一对叶状苞片;苞片宽卵形或宽披针形,长2.5—4厘米,宽1.5—2厘米,无柄或有短柄;花小,淡紫色或淡白色,直径4厘米;萼片5—6枚,倒卵状椭圆形或狭倒卵形,顶端钝尖,基部渐狭,表面无毛,脉纹显著,背面沿三条直的中脉形成一线状披针形的带,被短绒毛,边缘无毛;雄蕊长约7毫米,花药线形,长5毫米,花丝扁而短,无毛;子房狭卵形,长约3—4毫米,被紧贴的伏毛,花柱棒状,被毛,柱头不膨大。瘦果扁平,倒卵形,连宿存的喙状花柱长1.2—1.5厘米,宽5—6毫米,棕红色,幼时被伏毛,以后逐渐脱落。花期4月至5月,果期6月至7月。

在我国分布于江西北部,安徽南部、浙江北部及江苏南部。生于溪边,路边的草丛中,喜阴湿环境。越南、印度也有分布。

本种极近似于铁线莲 *C. florida* 惟花柱头不膨大,成棍棒状,被短伏毛,小叶片狭卵形,常分裂,小叶柄不显著等特征较易于区别。

组7. 绣球藤组——Sect. *Cheirosia* DC. Syst. 1: 162. 1818; Tamura in Sci. Rep. Osak. Univ. No. 4: 51. 1955, et 16(2): 34. 1967.——Gen. *Cheirosia* Spach Hist. Nat. Veg. Phaner. 7: 260. 1839.

藤本或为直立小灌木。单叶、三出复叶至二回羽状复叶;叶缘有锯齿、牙齿或裂片,少数全缘。花大,单生,常与叶簇生于短枝,基部有宿存芽鳞,极少为聚伞花序有3花。花梗通常无苞片。萼片开展。雄蕊无毛。

约15种,分布我国及南欧、小亚西亚、非洲、中亚、喜马拉雅山区和日本。我国约有以



短柱铁线莲 *Clematis cadmia*

1.花枝；2.雄蕊；3.心皮；4.果枝；5.瘦果。

下8种及8变种。

94. 槭叶铁线莲(北京植物志) 岩花(河北) 图31

Clematis acerifolia Maxim. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 54: 2. 1879; Kuntze in Verh. Bot. Ver. Brand. 26: 143. 1885; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 1. 1886; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50: 524. 1903; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 210. 1939; 北京植物志, 上册: 304, 图249. 1962; 中国高等植物图鉴 1: 750, 图1499. 1972.




图31: 槭叶铁线莲 *Clematis acerifolia*

1. 植株全形; 2. 根顶部; 3. 雄蕊; 4. 心皮。(刘春荣绘)

直立小灌木, 高30—60厘米, 除心皮外其余无毛。根木质, 粗壮。老枝外皮灰色, 有环状裂痕。叶为单叶, 与花簇生; 叶片五角形, 长3—7.5厘米, 宽3.5—8厘米, 基部浅心形, 通常为不等的掌状5浅裂, 中裂片近卵形, 侧裂片近三角形, 边缘疏生缺刻状粗牙齿; 叶柄长2—5厘米。花2—4朵簇生; 花梗长达10厘米; 花直径3.5—5厘米; 萼片5—8, 开展, 白色或带粉红色, 狭倒卵形至椭圆形, 长达2.5厘米, 宽达1.5厘米, 无毛; 雄蕊无毛; 子房有柔毛。花期4月, 果期5月至6月。

特产北京。生低山陡壁或土坡上。

95. 合苞铁线莲 尼泊尔铁线莲(拉汉种子植物名称) 图版70

Clematis napaulensis DC. Syst.

1: 164. 1818; Hook. f. et Thoms.

in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 2. 1872; Stapf in Curtis's Bot. Mag. 150: t. 9037. 1924; Péi in Sinensia 7: 475. 1936; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 211. 1939.—*C. montana* auct. non Buch.-Ham.; D. Don, Prodr. Fl. Nep. 192. 1825.—*C. cirrhosa* L. α . *nepalensis* (DC.) Kuntze in Verh. Bot. Ver. Brand. 26: 143. 1885.—*C. forrestii* W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. 8: 183. 1914.

藤本。茎有棱; 老枝圆柱形, 有纵条纹, 无毛, 外皮剥落。三出复叶, 数叶与花簇生, 或对生; 小叶片薄纸质, 卵状披针形或卵形、线状披针形, 长2—8厘米, 宽0.5—3.5厘米, 顶端锐尖或渐尖, 边缘1—2裂, 或为缺刻状牙齿、疏锯齿至全缘, 无毛或下面稍有短柔毛, 顶