

下8种及8变种。

94. 槭叶铁线莲(北京植物志) 岩花(河北) 图31

Clematis acerifolia Maxim. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 54: 2. 1879; Kuntze in Verh. Bot. Ver. Brand. 26: 143. 1885; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 1. 1886; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50: 524. 1903; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 210. 1939; 北京植物志, 上册: 304, 图249. 1962; 中国高等植物图鉴 1: 750, 图1499. 1972.




图31: 槭叶铁线莲 *Clematis acerifolia*

1. 植株全形; 2. 根顶部; 3. 雄蕊; 4. 心皮。(刘春荣绘)

直立小灌木, 高30—60厘米, 除心皮外其余无毛。根木质, 粗壮。老枝外皮灰色, 有环状裂痕。叶为单叶, 与花簇生; 叶片五角形, 长3—7.5厘米, 宽3.5—8厘米, 基部浅心形, 通常为不等的掌状5浅裂, 中裂片近卵形, 侧裂片近三角形, 边缘疏生缺刻状粗牙齿; 叶柄长2—5厘米。花2—4朵簇生; 花梗长达10厘米; 花直径3.5—5厘米; 萼片5—8, 开展, 白色或带粉红色, 狭倒卵形至椭圆形, 长达2.5厘米, 宽达1.5厘米, 无毛; 雄蕊无毛; 子房有柔毛。花期4月, 果期5月至6月。

特产北京。生低山陡壁或土坡上。

95. 合苞铁线莲 尼泊尔铁线莲(拉汉种子植物名称) 图版70

Clematis napaulensis DC. Syst.

1: 164. 1818; Hook. f. et Thoms.

in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 2. 1872; Stapf in Curtis's Bot. Mag. 150: t. 9037. 1924; Péi in Sinensia 7: 475. 1936; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 211. 1939.—*C. montana* auct. non Buch.-Ham.; D. Don, Prodr. Fl. Nep. 192. 1825.—*C. cirrhosa* L. α . *nepalensis* (DC.) Kuntze in Verh. Bot. Ver. Brand. 26: 143. 1885.—*C. forrestii* W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. 8: 183. 1914.

藤本。茎有棱; 老枝圆柱形, 有纵条纹, 无毛, 外皮剥落。三出复叶, 数叶与花簇生, 或对生; 小叶片薄纸质, 卵状披针形或卵形、线状披针形, 长2—8厘米, 宽0.5—3.5厘米, 顶端锐尖或渐尖, 边缘1—2裂, 或为缺刻状牙齿、疏锯齿至全缘, 无毛或下面稍有短柔毛, 顶