

生短柔毛至无毛,或幼时较密,花较小,直径2—3(—4)厘米。花期4月至6月,果期8月至9月。

在我国分布于云南北部、四川西部和西南部。生海拔2400—3000米间的山坡、山谷林中。模式标本采自四川盐边。

100. 薄叶铁线莲(秦岭植物志) 图版74

*Clematis gracilifolia* Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: 331. 1913; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 4: 186. 1923; et 9: 39. 1928, p. p., excl. specim. no. 12164; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 320. 1931, sphalm. *C. graciliflora*, et in Act. Hort. Gothob. 13: 210. 1939.—*C. montana* Buch.-Ham. var. *pentaphylla* Maxim. in Act. Hort. Petrop. 11: 10. 1890; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 4: 187. 1923; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 210. 1939.—*C. gracilifolia* var. *pentaphylla* (Maxim.) W. T. Wang, 植物分类学报 6(4): 380. 1957; 秦岭植物志 1(2): 296, 图253. 1974.

藤本。茎、枝圆柱形,有纵条纹,小枝有短柔毛,后变无毛,外皮紫褐色,老时剥落。三出复叶至一回羽状复叶,有3—5小叶,数叶与花簇生,或为对生;小叶片3或2裂至3全裂,若3全裂,则顶生裂片常有短柄,侧生裂片无柄,小叶片或裂片纸质或薄纸质,卵状披针形、卵形至宽卵形或倒卵形,长0.5—4厘米,宽0.3—2厘米,顶端锐尖,基部圆形或楔形,有时偏斜,边缘有缺刻状锯齿或牙齿,两面疏生贴伏短柔毛。花1—5朵与叶簇生;花直径2.5—3.5厘米;萼片4,开展,白色或外面带淡红色,长圆形至宽倒卵形,长1—2厘米,宽0.5—1.3厘米,外面有短柔毛,内面无毛;雄蕊无毛。瘦果无毛,卵圆形,扁,长约4毫米,宿存花柱长1.5—2.5厘米。花期4月至6月,果期6月至10月。

分布于西藏东部、云南西部(海拔3000—3800米)、四川西部(2500—3500米)、甘肃南部(2000—2500米)。生山坡林中阴湿处或沟边。模式标本采自四川灌县西边的巴郎山。

100b. 狭裂薄叶铁线莲(变种)

*Clematis gracilifolia* var. *dissectifolia* W. T. Wang et M. C. Chang in Addenda.

与薄叶铁线莲的区别:小叶片常2—3回深裂至全裂,小叶片或裂片较狭,狭披针形、长椭圆形至卵形,长0.5—2.5厘米,宽0.1—1厘米,边缘有1—2至数个锯齿或为小牙齿,有时裂片全缘或再分裂。花期6月。

产西藏南部和东部(海拔3000—3400米)、四川西部(2800—4000米)。生山坡灌丛中或路旁。模式标本采自四川木里。

100c. 大花薄叶铁线莲(变种)

*Clematis gracilifolia* var. *macrantha* W. T. Wang et M. C. Chang in Ad-



薄叶铁线莲 *Clematis gracilifolia*

1. 部分茎示花序和叶；2. 小叶片(下面)；3. 小叶片(上面)；4. 萼片(外面)；5. 萼片(内面)；6. 雄蕊；7. 心皮。