

印度北部、蒙古、苏联西伯利亚地区也有。

本种的基生叶叶片呈卵形，长圆形至椭圆形，长为宽的1—2倍，上部有3—7个齿裂或缺刻，而与长茎毛茛、云生毛茛有别。

3b. 深齿毛茛

Ranunculus pulchellus var. *stracheyanus* (Maxim.) Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. 13: 147, fig. 4, nr. 1—8. 1939; Hara, Fl. E. Himal. 91. 1966.—*R. affinis* R. Br. var. *stracheyanus* Maxim. Fl. Tangut. 14. 1889.

与美丽毛茛区别：茎多分枝；基生叶宽卵形至椭圆形，长1—2(3)厘米，基部截形至圆楔形，3中裂或稍深，裂片长圆形、披针形至卵形，全缘或侧裂片2—3裂。

在我国产西藏及甘肃等地。生于海拔2300—4800米潮湿草地。锡金也有。

4. 浅裂毛茛

Ranunculus lobatus Jacq. ex Camb. Voy. Bot. Inde, 5. t. 1. 1842; Hook. f. et Thoms. in Fl. Brit. Ind. 1: 17. 1872; E. Nasir in Fl. West. Pakistan 271. 1972.

多年生草本。须根簇生。茎斜升直立，高6—10厘米，多分枝，近无毛。基生叶多数，叶片卵圆形至圆形，长8—20毫米，宽6—15毫米，质地较厚，无毛，基部圆形至宽楔形，顶端有3—5浅齿裂；叶柄长2—5厘米，无毛，基部有膜质长鞘。下部叶与基生叶相似，中部及上部叶有短柄至无柄，叶片3—5中裂或单一全缘，无毛或生柔毛；花着生茎顶和分枝顶端，直径1.5—2厘米；花梗长2—4厘米，生白色或黄色柔毛；萼片卵形，长约6毫米，带褐色，生柔毛，边缘膜质；花瓣5，宽倒卵形至近圆形，长及宽7—10毫米，有细密脉纹，基部骤窄成长约1毫米的爪，蜜槽呈杯状袋穴；花药长1.5—2毫米；花托无毛。聚合果卵圆形，直径约6毫米；瘦果卵球形，长约1.4毫米，无毛，喙直伸，长约1毫米。花果期6月至8月。

分布于我国西藏西部(噶尔、扎达至仲巴)。生于海拔4300—5100米的湿润草甸中。印度北部和锡金也有。

本种与美丽毛茛相近，但以花较大，直径约2厘米，基生叶卵形至圆形，革质，顶端有3—5齿，茎多分枝且铺散而有别。

5. 大金毛茛

Ranunculus pseudolobatus L. Liou in Addenda.

多年生草本。须根稍粗，簇生；茎倾斜上升，或基部各节生根成短匍匐茎，高9—15厘米，直径2—3毫米，多分枝，无毛或生白柔毛。基生叶多数；叶片圆形至扇形，长约1厘米，宽约1.5厘米，基部宽楔形至圆形或浅心形，边缘有3—9浅圆钝齿，革质，无毛或表面贴生细毛；叶柄长3—10厘米，近无毛，基部有膜质长鞘。茎生叶多数，叶片3深裂，裂片披针形，长0.5—1厘米，宽1—3毫米，中裂片常较大，表面和边缘贴生细毛，柄叶长