

monanthos Fin. et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 51: 302, 1904.

多年生草本。须根伸长簇生。茎铺散，斜升，高 20—50 厘米，下部节偃地生根，多分枝，密生开展的白色或淡黄色柔毛。基生叶与茎生叶相似，为 3 出复叶；叶片圆肾形至宽卵形，长 2—5 厘米，宽 3—6 厘米，基部心形，中央小叶宽卵形或菱状卵形，3 浅裂至较深裂，边缘有锯齿，小叶柄长 1—5 毫米，生开展柔毛；侧生小叶不等地 2 裂，背面或两面疏生柔毛；叶柄长 2—5 厘米，密生开展的柔毛，基部扩大成褐色膜质的宽鞘抱茎。上部叶较小，叶柄也较短。花与叶对生，直径 1.2—1.8 厘米；花梗长 3—8 厘米，密生柔毛；萼片狭卵形，长 4—6 毫米，为宽的 2 倍，外面生柔毛，花期向下反折，迟落；花瓣 5，黄色或上面变白色，狭倒卵形至椭圆形，长 6—10 毫米，宽 3—5 毫米，有 5—9 条或深色脉纹，下部渐窄成长爪，蜜槽小鳞片位于爪的基部；雄蕊 20 余枚，花药长约 2 毫米；花托粗短，密生白柔毛。聚合果圆球形，直径约 1 厘米；瘦果扁平，长 3—4(5) 毫米，宽 3—3.5 毫米，为厚的 5 倍以上，无毛，边缘有宽约 0.4 毫米的宽棱，喙长约 1 毫米，成锥状外弯。花果期 5 月至 10 月。

在我国分布于四川、云南东部、贵州、广西、湖南、湖北、江西、江苏、浙江、福建及陕西、甘肃等省。生于海拔 300—2500 米的山坡林边及平原湿地。日本也有。

全草药用，捣碎外敷，发泡截疟及治疮毒，腹水浮肿。

本种以花萼向下反折，花瓣狭椭圆形，有长爪，瘦果宽大，长约 4 毫米，边缘有宽棱以及茎偃卧，节上生根，花与叶对生而易于识别。

69. 褐鞘毛茛

Ranunculus vaginatus Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 303, tab. 6, f. 10—11. 1931.

多年生草本。须根簇生。茎渐升或直立，高 5—10(—20) 厘米，常单一，伏生白短毛。基生叶与茎生叶相似，为 3 出复叶，叶片近圆形，长与宽为 1—4 厘米，小叶宽倒卵形，3 中裂，有时侧生小叶 2 裂，边缘有粗齿牙，两面或背面伏生白短毛，小叶柄短或无；叶柄长 2—6 厘米，伏生白柔毛，基部有褐色膜质宽鞘，鞘两侧的耳部钝圆。上部叶较小，3 裂，叶柄较短。花单生茎顶或与上部叶对生，直径 0.8—1 厘米；花梗细，长 3—5 厘米，被白柔毛；萼片窄三角形，长 3—4 毫米，有 3 脉，顶端尖，外面有柔毛，边缘宽膜质，花期向下反折；花瓣 5—6，黄白色或下部暗褐色，椭圆形，长 6—9 毫米，约为宽的 3 倍，有 7—9 脉，有狭长爪，蜜槽鳞片位于爪上端，花药长约 1 毫米，花丝细长 4 毫米，花托细短，无毛。聚合果球形，直径约 6 毫米；瘦果 6—12 枚，扁平，长 2—3 毫米，无毛，边缘有棱，喙渐尖，长达 2 毫米，呈镰刀状外弯。花果期 4 月至 7 月。

分布于云南西北部，四川西部及陕西。生于海拔 3000 米左右的山坡草地和沟旁。模式标本采自四川西昌。

本种与扬子毛茛相近，似为其分布区偏西的一个矮小类型，仅以植株及叶片较小，伏生白短毛，花托细短，无毛；瘦果数少，约 10 枚左右，较小，果喙伸长可达 2 毫米而有别。