

0.2 毫米与近缘种多花毛茛有别。

72. 匍枝毛茛 (东北植物检索表) 图版 96: 5—7

Ranunculus repens L. Sp. pl. 554. 1753; DC. Prodr. 1: 38, 1824; Fl. URSS. 7: 423. 1937; Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. 13: 166. 1939; 东北草本植物志 3: 198. 1975.——*R. repens* L. var. *major* Nakai in Bot. Mag. Tokyo 42: 23. 1928; 东北植物检索表 84. 1959.——*R. repens* L. var. *brevistylus* Maxim. in Act. Hort. Petrop. 11: 25. 1890; Hand.-Mazz. l. c.——*R. repens* L. form. *polypetalum* S. H. Li et Y. H. Huang, l. c., 1975.

多年生草本。根状茎短，簇生多数粗长须根。茎下部匍匐地面，节处生根并分枝，上部直立，高 30—60 厘米，粗壮，中空，有纵条纹，通常无毛。叶为三出复叶，基生叶和下部叶有长柄；叶片宽卵圆形，长与宽为 3—9 厘米，小叶有长 0.5—3 厘米的小叶柄，3 深裂或 3 全裂，裂片菱状楔形，再不等地 2—3 中裂，边缘有粗锯齿或缺刻，顶端尖，大多无毛；叶柄长 3—6 厘米，基部扩大呈膜质宽鞘，无毛。下部叶与基生叶相似；上部叶较小，裂片线形，有短柄至无柄。花序有疏花；花直径 2—2.5 厘米；萼片卵形，长 5—7 毫米，无毛或疏生柔毛；花瓣 5—8，橙黄色至黄色，卵形至宽倒卵形，长 8—12 毫米，宽 6—8 毫米，基部渐狭成爪，蜜槽有鳞片覆盖；花药长约 1.2 毫米，花丝长约为 3 毫米；花托长圆形，生白柔毛。聚合果卵球形，直径约 8 毫米；瘦果扁平，长 2—3 毫米，无毛，边缘有棱，喙直或外弯，长 0.5—1 毫米。 花果期 5 月至 8 月。

在我国分布于新疆、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江。生沟边草地。在亚洲北部、欧洲广布。

民间药用。

本种茎下部匍匐，节上生根，多分枝，中空，近无毛；为三出复叶，小叶有柄，3 深裂或 3 全裂，裂片宽大有齿；花较大，花托有毛，瘦果扁平，容易识别。

73. 长嘴毛茛 (东北草本植物志) 图版 101: 5—8

Ranunculus tachiroei Franch. et Sav. Enum. pl. Jap. 2: 267. 1876; Nakai, Fl. Kor. 1: 22. 1909; Kitag. Lineam. Fl. Mansh. 226. 1939; Ohwi, Fl. Jap. 526. 1953; 东北草本植物志 3: 198. 1975.

多年生草本。须根粗长簇生。茎直立，高 60—100 厘米，直径 5—8 毫米，中空，下部被开展的长硬毛，上部有分枝，多伏生长毛。基生叶和下部叶有长柄；叶片宽卵形至三角形，长约 10 厘米，2 回 3 出复叶，小叶有长 2—4 厘米具毛的小叶柄，小叶片 2—3 深裂，裂片披针形至倒卵状楔形，长 3—5 厘米，宽 1—2 厘米，上部有粗锯齿或缺刻，顶端锐尖，两面伏生硬毛；叶柄长达 20 厘米，生开展的硬毛。上部叶 3 全裂，裂片线形或楔形，全缘或有锐齿，伏生硬毛，有短柄至无柄。聚伞花序疏生多花；花直径 1—1.5 厘米，花梗长约 5 厘米，被硬毛；萼片卵形，长 4—5 毫米，外面被毛；花瓣 5，黄色或表面变白色，椭圆形，



1—4. 石龙芮 *Ranunculus sceleratus* 1. 植株; 2. 花瓣; 3. 聚合果(示花托);
4. 果。5—7. 简枝毛茛 *R. repens* 5. 植株; 6. 花瓣; 7. 果。(张泰利绘)