

小叶 3—6 片；叶柄长 3—8 厘米；小叶革质，倒卵形、倒披针形或椭圆形，长 5—7 厘米，宽 3.5—5 厘米，先端圆而具凸头，顶具小硬尖，基部狭圆或楔形，边缘加厚，上面淡绿色，下面粉绿色；基出脉 3 条，侧脉每边 5—6 条，近平展，与网脉同于小叶两面清晰凸起；小叶柄长 1—2 厘米。花浅黄色，雌雄同株，数朵组成疏花的伞房式总状花序；花序长约 10 厘米，3—4 个簇生于叶腋；总花梗纤细；小苞片线状披针形，早落；花梗纤细，长 2.5—4.5 厘米。雄花：外轮萼片卵状披针形，长约 8 毫米，宽约 3 毫米，内轮萼片狭线形，长约 6 毫米，宽约 1 毫米；花瓣缺；花药彼此分离，长约 1.5 毫米，顶具长约 2 毫米的角状附属体，花丝长 1.5—2 毫米，上部分离，下部合生为短的花丝管，退化心皮锥尖，长约 1.5 毫米。雌花：外轮萼片长圆状披针形，长约 11 毫米，宽约 4.5 毫米，内轮的狭披针形，宽约 2 毫米；心皮近披针形，长约 5 毫米，退化雄蕊棒状，长约 1 毫米。果未见。 花期 8—11 月。

产于海南（保亭、陵水、琼中）。生于海拔 500—800 米的山地山谷杂木林中。模式标本采自海南保亭吊罗山。

本种与产我国西南部的羊瓜藤 *S. duclouxii* Gagnep. 在外形上有些相似，但后者的花较大（长 1.8—2.2 厘米），花梗较短，萼片较厚，可资区别。

14. 倒心叶野木瓜

Stauntonia obcordatilimba C. Y. Wu et S. H. Huang in Fl. Yunnan 2: 11, Pl. 3, 4—6. 1979; H. N. Qin in Cathaya 8—9: 138. Fig. 60. 1997.

木质藤本。茎纤细，有线纹。掌状复叶有小叶 3—5 片；叶柄长 4—5 厘米；小叶革质，倒卵状圆形，有时阔椭圆形，长 2.5—6 厘米，宽 2—4 厘米，大小变化极大，先端圆、微凹至倒心形，基部阔楔形或近圆形，边缘增厚，上面有光泽，下面苍白色；小叶柄较纤细，长约 1 厘米。花雌雄同株同序，数朵组成簇生于叶腋的总状花序；总花梗和花梗均极纤细，花序基部具数枚阔卵形的苞片。雄花黄绿色；花梗长 2.5—3.5 厘米；萼片 6，外轮 3 片披针形，长约 14 毫米，宽约 3.5 毫米，先端长渐尖，较薄，两面平滑，内轮 3 片较狭；花瓣缺；雄蕊较萼片短一半，花丝合生几达顶端，长约 9 毫米，药隔突出所成之角状附属体长约 2 毫米，退化心皮 3，很小。雌花：萼片与雄花的相似但较阔，心皮 3，卵状柱形，基部有 6 枚长约 1.5 毫米的退化雄蕊。果未见。 花期 4 月。

产于云南东南部（富宁）。生于海拔 1000 米之山地密林边缘。

15. 瑶山野木瓜 瑶山七姐妹

Stauntonia yaoshanensis F. N. Wei et S. L. Mo in Guihaia 3: 309. 1983; H. N. Qin in Cathaya 8—9: 164. 1997, pro syn.

常绿木质大藤本。全株无毛；小枝具纵线纹。掌状复叶有小叶 5—7 片；叶柄长 15—18 厘米；小叶薄革质，长圆形或倒披针状长圆形，长 12—17 厘米，宽 4—6.5 厘