

224. 叶匙状楔形, 先端微凹, 苞片较花梗短 211. 贡山小檗 *B. coryi* Veitch
224. 叶倒卵形, 先端圆钝, 苞片与花梗等长 212. 万源小檗 *B. metapolyantha* Ahrendt
220. 落叶灌木。
225. 花瓣先端缺裂, 叶倒卵形, 厚纸质或纸质。
226. 叶长达 6.5 厘米, 花梗长 5—12 毫米, 果红色, 被白粉, 无宿存花柱 213. 黄皮小檗 *B. xanthophloea* Ahrendt
226. 叶长达 2.7 厘米, 花梗长 2—3 毫米, 果紫红色, 无白粉, 具宿存花柱 214. 同色小檗 *B. concolor* W. W. Smith
225. 花瓣先端全缘, 叶狭倒披针形, 薄纸质 215. 北京小檗 *B. beijingensis* Ying

1. 单花小檗

Berberis candidula Schneid. in Bull. Herb. Boissier (2), 5 : 402, 1905; Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. 57 : 45, 1961; Chamberlain et C. M. Hu, in Notes Bot. Gard. Edinb. 42 (3): 536, 1985; 湖北植物志 1 : 389, 图 548, 1976.

常绿灌木, 高约 1 米。老枝灰褐色, 密生小疣点, 幼枝淡绿色; 茎刺三分叉, 近圆柱形、长 1—1.5 厘米。叶厚革质, 椭圆形至卵圆形, 长 1—2 厘米, 宽 5—10 毫米, 先端渐尖, 具刺尖头, 基部楔形, 上面深绿色, 有光泽, 中脉凹陷, 侧脉不显, 背面灰白色, 密被白粉, 中脉和侧脉明显隆起, 两面网脉不显, 叶缘明显向背面反卷, 每边具 1—4 刺齿; 叶柄极短或近无柄。花单生; 花梗长 4—10 毫米, 无毛; 花黄色; 萼片 3 轮, 外萼片长圆状卵形, 黄红色, 长约 4 毫米, 宽约 2 毫米, 先端急尖, 中萼片长圆状倒卵形, 长约 7 毫米, 宽约 5 毫米, 内萼片倒卵形, 长约 10 毫米, 宽约 8 毫米; 花瓣倒卵形, 长约 8 毫米, 宽约 6 毫米, 先端全缘, 基部楔形, 具 2 枚卵形腺体; 雄蕊长约 5 毫米, 药隔延伸, 先端平截; 胚珠 3—4 枚。浆果椭圆形, 长 8—9 毫米, 直径 4—5 毫米, 顶端无宿存花柱, 微被白粉。花期 4—5 月, 果期 6—9 月。

产于四川、湖北。生于山地路旁或灌丛中。海拔 1200—3000 米。模式标本采自四川城口。

2. 黄球小檗

Berberis chrysosphaera Mulligan in Kew Bull. 1940, 77, 1940 et in Journ. Roy. Hort. Soc. 65 : 281, figs. 77, 78, 1940; Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. 57 : 41, 1961; Chamberlain et C. M. Hu in Notes Bot. Gard. Edinb. 42 (3): 534, 1985; 西藏植物志 2 : 149, 1985.

常绿灌木。枝暗红色, 具稀疏小疣点, 节间长 1.5—3 厘米; 茎刺三分叉, 长 1—2 厘米, 腹面具槽。叶革质, 椭圆形或倒卵状椭圆形, 长 1.5—4 厘米, 宽 4—10 毫米,