

粉，含种子4枚。果期10月。

产于云南。生于山顶草地。海拔3300米。模式标本采自巧家（药山）。作者未见标本，系根据原始描写及《云南植物志》第七卷描述。该志描述“浆果单生”，但“图版13. 9—12，浆果两两簇生”，描述与图不尽相符。

10. 乌蒙小檗

Berberis woomungensis C. Y. Wu ex S. Y. Bao in 植物研究 5 (3): 4, 图4, 1985; 云南植物志 7: 41, 图版13, 1—8, 1997.

落叶灌木，高0.5—1米。老枝棕色，具黑色疣点，幼枝棕红色，扭曲，具条棱；茎刺三分叉，长10—17毫米，腹面具浅槽，黄棕色。叶薄纸质，长圆状倒卵形或倒披针形，长1—2厘米，宽5—7毫米，先端圆形或急尖，具1突尖，基部渐狭，下延，上面绿色，背面淡绿色，不被白粉，中脉明显隆起，两面网脉不显，叶缘平展，全缘；无柄。花单生；花梗长5—10毫米，无毛；花黄色；萼片2轮，外萼片长圆形，长约7毫米，宽3—4毫米，内萼片长圆状椭圆形，长约6毫米，宽约4毫米；花瓣长圆状倒卵形，长约4毫米，宽约2毫米，先端缺裂，裂片急尖，基部缢缩呈爪，具2枚近靠的倒披针形腺体；雄蕊长约4毫米，药隔不延伸，先端平截；胚珠3枚，具柄。浆果长圆形，红色，长约10毫米，直径5—6毫米，顶端具短宿存花柱，微被白粉。花期5月，果期11月。

产于云南。生于山坡灌丛中。海拔3700—4400米。模式标本采自禄劝乌蒙山。

11. 厚檐小檗

Berberis crassilimba C. Y. Wu ex S. Y. Bao in 植物研究 5 (3): 2, 图2, 1985; 云南植物志 7: 38, 图12, 5—8, 1997.

常绿灌木，高0.5—1米。老枝圆柱形，棕灰色，无疣点，幼枝紫红色，具条棱；茎刺三分叉，暗棕黄色，长约1.5厘米，腹面具浅槽。叶革质，长圆形至倒卵形，长约1.2厘米，宽约5毫米，先端圆形，具1突尖，基部楔形，上面有光泽，深绿色，中脉扁平，近无脉，背面淡绿色，不被白粉，中脉及1—2对侧脉显著，叶缘增厚，全缘；近无柄。花单生；花梗长4—8毫米，无毛；花黄色；萼片2轮，外萼片长椭圆形，长约7毫米，宽约3.5毫米，先端钝尖，内萼片阔倒卵形，长约7毫米，宽约5毫米，先端圆形；花瓣倒卵形，长5—6毫米，宽2.5—3毫米，先端缺裂，基部缢缩呈爪，具2枚分离的长圆形腺体；雄蕊长3—3.5毫米，药隔先端平截；胚珠3枚，具柄。浆果球形或椭圆形，长5—7毫米，直径5—6毫米，顶端无宿存花柱，不被白粉。花期3—6月，果期10月。

产于云南、四川。生于开阔石坡上或向阳坡地。海拔3600米。模式标本采自云南中甸。

本种近似刺红珠 *Berberis dictyophylla* Franch.，但本种叶上面近无脉，背面仅侧脉