

产于四川、湖北、贵州北部。生于山地灌丛中、林中、林缘和河边。海拔 2000—3300 米。模式标本采自湖北西部。

### 67. 屏边小檗

*Berberis pingbienensis* S. Y. Bao in 植物研究 5 (3): 12, 图 11, 1985; 云南植物志 7: 58, 图版 19, 7—8, 1997.

常绿灌木，高约 2 米。枝棕灰色，圆柱形，具条棱，无疣点，无刺。叶革质，倒披针形或倒卵形，长 5—11 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，先端急尖，基部楔形，上面黄绿色，无光泽，中脉微凹陷，侧脉斜上至边缘网结，网脉显著，背面棕黄色，中脉和侧脉隆起，网脉不显；具短柄。花未见。浆果 2—3 枚簇生；果柄长 1.5—2 厘米；浆果近球形，红色，长 5—7 毫米，直径约 4 毫米，顶端无宿存花柱，不被白粉。果期 4 月。

产于云南。生于石灰山杂木林缘。海拔 1900 米。模式标本采自云南屏边。

本种与渐尖叶小檗 *B. acuminata* Franch. 相近似，不同在于本种枝和小枝无刺，叶先端钝尖；果序 2—3 颗簇生；浆果红色，近球形，不被白粉。

### 68. 错那小檗 卷叶小檗 (西藏植物志)

*Berberis griffithiana* Schneid. in Bull. Herb. Boiss. ser. 2. 5: 403, 1905; Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. 57: 43, 1961; Chamberlain & C. M. Hu in Notes Bot. Gard. Edinb. 42 (3): 547, 1985; 西藏植物志 2: 142, 图 43, 7—8, 1985. —*B. subpteroclada* Ahrendt in Journ. Bot. 79, Supl: 21, 1941. —*B. subpteroclada* var. *impar* Ahrendt. in loc. cit., 1941.

#### 68a. 错那小檗 (原变种)

##### var. *griffithiana*

常绿灌木，高 2—3 米。枝圆柱形，有时具条棱，淡黄色，无毛；茎刺三分叉，长 1.2—2.5 厘米。叶革质，椭圆状披针形，长 1.2—3.2 厘米，宽 4—9 毫米，先端急尖，具 1 刺尖头，基部楔形，上面暗绿色，中脉微隆起，侧脉显著，网脉不显，背面亮淡绿色，中脉明显隆起，侧脉和网脉不显；叶缘微向背面反卷，略呈波状，每边具 2—4 粗刺齿；无叶柄。花 2—10 朵簇生；花梗长 11—22 毫米；小苞片卵形，长约 2 毫米，宽约 1 毫米，先端渐尖；萼片 2 轮，外萼片卵形，长 5 毫米，宽 4 毫米，急尖，内萼片长圆状倒卵形，长 7 毫米，宽 4.5 毫米，先端圆钝；花瓣倒卵形，长 7 毫米，宽 4 毫米，先端缺裂，基部缢缩呈爪，具 2 枚分离腺体；雄蕊长约 5 毫米，药隔先端突尖；子房含胚珠 3—4 枚。浆果梨状或椭圆形，长 7—9 毫米，直径 5—6 毫米，顶端具明显宿存花柱，被白粉。花期 5—6 月，果期 7 月。

产于西藏。生于路旁、林缘、灌丛中、铁杉林、杜鹃林或竹林中。海拔 2500—3300 米。不丹也有分布。模式标本采自不丹。

#### 68b. 灰叶小檗 (变种)