

var. **pallida** (Hook. f. et Thoms) Chamberlain & C. M. Hu in Notes Bot. Gard. Edinb. **42** (3): 547, 1985. — *B. wallichiana* DC. var. *pallida* Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. **1**: 226, 1855. — *B. bhutanensis* Ahrendt. in Journ. Bot. **79**, Suppl; 17, 1941. — *B. leptopoda* Ahrendt. op. cit: 33, 1941. — *B. replicata* W. W. Smith var. *dispar* Ahrendt. op. cit.: 20, 1941. — *B. taronensis* Ahrendt. var. *trimensis* Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. **57**: 79, 1961.

本变种与原变种主要区别在于：本变种叶灰白色，背面被白粉。

产于西藏东南部。生于灌丛中、林迹地或河滩。海拔 2100—3500 米。不丹东部也有分布。

69. 近光滑小檗

Berberis sublevi W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb. **9**: 83, 1916; Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. **57**: 58, 1961; Chamberlain & C. M. Hu in Notes Bot. Gard. Edinb. **42** (3): 555, 1985; 云南植物志 **7**: 44, 1997. — *B. sublevi* var. *grandifolia* Schneid. Repert. Sp. Nov. **46**: 253, 1939. — *B. sublevi* var. *exquista* Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. **57**: 58, 1961. — *B. sublevi* var. *macrocarpa* (Hook. f. et Thoms.) Ahrendt. op. cit: 58, 1961. — *B. prainiana* Schneid. ex Stapf in Curtis's Bot. Mag. **157**, sub. t. 9153, 1928, in obs.. — *B. wallichiana* var. *macrocarpa* Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. **1**: 226, 1855. — *B. wallichiana* var. *gracilipes* Ahrendt in Journ. Bot. **79**, Suppl: 17, 1941.

常绿灌木，高 1—3 米。枝棕灰色，具明显棱槽和稀疏疣点；茎刺细弱，三分叉，长 1—2 厘米，腹面扁平，与枝同色。叶薄革质，线状披针形，长 4—12 厘米，宽 1—1.5 厘米，先端渐尖，基部楔形，上面暗绿色，中脉微凹陷，侧脉清晰可见，背面苍绿色，中脉明显隆起，侧脉微隆起，不被白粉，两面网脉不显，叶缘平展或微向背面反卷，每边具 10—28 密刺齿，有时近全缘；具短柄。花 5—30 朵簇生；花梗细弱，长 7—15 毫米；萼片 2 轮，外萼片卵形，带红色，长约 2.5 毫米，宽约 2 毫米，近急尖，内萼片倒卵形至长圆状椭圆形，长约 5 毫米，宽约 3 毫米；花瓣倒卵形，长 5—5.5 毫米，宽约 3 毫米，先端断裂，基部缢缩呈爪，具 2 枚分离腺体；雄蕊长约 3.5 毫米，药隔先端钝形；胚珠单生；珠柄长于胚珠 5—6 倍。浆果紫红色，卵形，长 6—7 毫米，直径 3—3.5 毫米，顶端具短宿存花柱，不被白粉。花果期 5—11 月。

产于云南、四川。生于山坡灌丛中、河岸边和林中。海拔 1500—2700 米。缅甸至印度东北部有分布。模式标本采自云南腾冲。

70. 无量山小檗

Berberis wuliangshanensis C. Y. Wu ex S. Y. Bao in 植物研究 **5** (3): 14, 1985; 云南植物志 **7**: 48, 图版 15, 11—17, 1997.