

1—2 枚。果梗暗褐色，长达 2 厘米；浆果卵状椭圆形或卵圆形，长 8—9 毫米，直径约 6 毫米，黑色，具极明显宿存花柱，被白粉，种子 1—2 粒。花期 3—5 月，果期 5—10 月。

产于四川。生于山坡灌丛中或林中。海拔 1200—2000 米。模式标本采自四川汉源。

73b. 汶川小檗 (变种)

var. **acanthophylla** Schneid. in op. cit : 362, 1913; Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. **57** : 76, 1961; Chamberlain et C. M. Hu in Notes Bot. Gard. Edinb. **42** (3): 546, 1985.

本变种与原变种主要区别在于本变种叶缘波状，每边具 2—6 粗疏刺锯齿。

产于四川。生于阳坡沟底或灌丛中。海拔 2000—2500 米。模式标本采自汶川。

74. 鼠叶小檗 (新拟) 柳叶小檗 (植物研究)

Berberis iteophylla C. Y. Wu ex S. Y. Bao in 植物研究 **5** (3): 7, 图 6, 1985; 云南植物志 **7** : 52, 图版 17, 9—15, 1997.

常绿灌木，高约 1.5 米。老枝圆柱形，棕灰色，具条棱和黑色疣点，幼枝淡黄色；茎刺细弱，三分叉，长 1—1.2 厘米。叶革质，密集簇生，线状披针形，长 9—16 厘米，宽 1.4—2.4 厘米，先端急尖，基部楔形，上面有光泽，中脉明显凹陷，侧脉微显，背面淡黄绿色，中脉和侧脉隆起，不被白粉，两面网脉不显，叶缘每边多达 30 枚刺齿；叶柄长约 5 毫米。花 12—20 朵簇生，花梗细弱，长约 1.5 厘米，无毛；萼片 2 轮，外萼片三角状卵形，长约 3 毫米，宽约 2 毫米，先端急尖，内萼片长圆形，长约 4 毫米，宽约 3 毫米，先端渐尖；花瓣倒卵形，长约 3 毫米，宽约 2 毫米，先端圆形，浅缺裂，基部渐狭，缢缩呈爪，具 2 枚近靠腺体；雄蕊长约 2 毫米，药隔先端截形；胚珠单生，具柄。浆果（未熟）椭圆形、顶端具明显宿存花柱，不被白粉。花果期 4—8 月。

产于云南。生于山坡、溪边、灌丛中或疏林中。海拔 2180 米。模式标本采自云南双柏。

75. 大叶小檗

Berberis ferdinandi-coburgii Schneid. in Sargent, Pl. Wils. **1** : 364, 1913; Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. **57**: 70, 1961; Chamberlain et C. M. Hu in Notes Bot. Gard. Edinb. **42** (3): 554, 1985; 云南植物志 **7** : 49, 图版 16, 1—2, 1997.

常绿灌木，高约 2 米。老枝具棱槽，散生黑色疣点；茎刺细弱，三分叉，长 7—15 毫米，腹面具槽。叶革质，椭圆状倒披针形，长 4—9 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，先端急尖，具 1 刺尖，基部楔形，上面栗色，有光泽，中脉和侧脉凹陷，背面棕黄色，中脉和侧脉隆起，两面网脉显著，不被白粉，叶缘平展，有时微向背面反卷，每边具 35—60 刺齿；叶柄长 2—4 毫米。花 8—18 朵簇生；花梗细弱，长 1—2 厘米，无毛；花黄色；小苞片红色，长约 1.5 毫米；萼片 2 轮，外萼片披针形，长约 3 毫米，宽约 1 毫米，先