

1915; Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. **57** : 67, 1961; 湖北植物志 **1** : 394, 图 556, 1976.

常绿灌木，高 1—2 米。老枝具条棱，暗灰色，不具疣点，幼枝紫红色，光滑无毛；茎刺三分叉，淡黄色，长 1—2.5 厘米，有时缺如。叶厚革质，狭披针形，长 4—11 厘米，宽 9—19 毫米，先端渐尖，基部狭楔形，上面深绿色，中脉凹陷，侧脉微隆起，背面淡绿色或带红褐色，中脉和侧脉明显隆起，两面网脉隐约可见；不被白粉；叶缘干后稍向背面反卷，每边具 10—25 刺齿；叶柄长约 4 毫米。花 5—30 朵簇生；花梗长 10—20 毫米，带紫红色；花瓣较外萼片长；子房含胚珠 1—3 枚。浆果黑色，倒卵形，长 7—9 毫米，直径 4—5 毫米，顶端具极短宿存花柱，不被白粉；含种子 1—3 枚。花期 3—5 月，果期 5—9 月。

产于湖北、四川。生于山坡路旁、林下或灌丛中。海拔 1400—1700 米。

84. 南川小檗 (新拟)

Berberis fallaciosa Schneid. in Repert. Sp. Nov. **46** : 258, 1939, Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. **57** : 60, 1961; Chamberlain et C. M. Hu in Notes Bot. Gard. Edinb. **42** (3): 541, 1985.

常绿灌木，高 1—3 米。老枝圆柱形，暗灰色，光滑无毛，幼枝灰色，具棱槽和稀疏细小疣点；茎刺三分叉，淡黄色，长 1—4 厘米。叶革质，披针形，椭圆状披针形或倒卵状披针形，长 3—13 厘米，宽 1—2.2 厘米，先端近渐尖，基部渐狭，上面深绿色，中脉明显凹陷，侧脉微显，背面黄绿色，中脉明显隆起，侧脉微隆起，两面网脉不显，叶缘常向背面反卷，每边具 15—30 刺齿；叶柄长 2—6 毫米。花 2—5 朵簇生；花梗长 10—25 毫米，带红色；花黄色；小苞片阔卵形，先端钝；萼片 2 轮，外萼片倒卵形，长约 3.5 毫米，宽约 3 毫米，内萼片倒卵形，长约 5 毫米，宽约 4 毫米；花瓣长圆状倒卵形，长约 4 毫米，宽约 2.3 毫米，先端缺裂，基部略呈爪，具 2 枚紧靠的腺体；雄蕊长约 3 毫米，药隔稍延伸、先端突尖；胚珠 2 枚，无柄。浆果倒卵状，长 6—9 毫米，直径 5—6 毫米，顶端无宿存花柱，不被白粉。花期 4—5 月，果期 6—10 月。

产于四川、湖北。生于山坡灌丛中、林下、路边、沟边或林缘。海拔 1000—2700 米。模式标本采自南川金佛山。

85. 可爱小檗

Berberis amabilis Schneid. in Repert. Sp. Nov. **46** : 457, 1939; Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. **57** : 43, 1961; Chamberlain et C. M. Hu in Notes Bot. Gard. Edinb. **42** (3): 547, 1985; 云南植物志 **7** : 60, 1997.——*B. amabilis* var. *holophylla* C. Y. Wu et S. Y. Bao in 植物研究 **5** (3): 5, 1985, syn. nov.

常绿灌木，高 1—2 米。老枝圆柱形，棕灰色，幼枝淡黄色，具条棱和细小疣点，无毛；茎刺三分叉，近圆柱形，有时腹面具槽，长 1—3 厘米。叶革质，长椭圆形，椭

圆状披针形或倒披针形，长4—8厘米，宽1—1.5厘米，先端急尖，具1刺尖头，基部楔形，上面绿色，中脉明显凹陷，侧脉不显，背面被白粉，中脉明显隆起，侧脉显著，两面网脉不显，叶缘一般向背面反卷，每边具3—6细小刺齿，有时全缘；叶柄长1—2毫米。花6—25朵簇生；花梗长10—18毫米，细弱、红色、无毛；花深黄色；小苞片卵形，长约2毫米，宽约1.5毫米，先端渐尖；萼片2轮，外萼片阔卵形，长约5毫米，宽约4毫米，内萼片椭圆形或椭圆状长圆形，长6—7毫米，宽约4毫米；花瓣倒卵形，长6—7毫米，宽约4毫米；先端缺裂，基部缢缩呈爪，具2枚分离腺体；雄蕊长约5毫米，药隔先端突尖；胚珠2枚，无柄。浆果黑色，椭圆形，长6—8毫米，直径3—5毫米，顶端无宿存花柱，不被白粉。 花果期6—8月。

产于云南。生于山坡阴处，灌丛中或林缘。海拔1800—3300米。缅甸北部也有分布。模式标本采自缅甸北部。

Schneider发表此种时，根据Kingdon - Ward 9324（花）和Rock 7388（果）描述，前者偶有全缘叶，后者常有全缘叶。故将全缘小檗 *B. amabilis* var. *holophylla* C. Y. Wu et S. Y. Bao 并入原变种。

86. 锐齿小檗

Berberis arguta (Franch.) Schneid. in Bull. Herb. Boiss. Ser. 1, 8: 197, 1908; Ahrendt in Journ. Linn Soc. Bot. 57: 60, 1961; Chamberlain et C. M. Hu. in Notes Bot. Gard Edind. 42 (3): 541, 1985; 云南植物志 7: 64, 1997.——*B. wallichiana* DC. f. *arguta* Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 33: 388, 1886.

常绿灌木，高1—1.5米。枝圆柱形，草黄色至棕灰色，光滑无毛；茎刺粗壮，三分叉，长2.5—4厘米，与枝同色，腹面具槽。叶革质，披针形至长圆状披针形，长4.5—14厘米，宽1.5—2.5厘米，先端钝尖至短渐尖，基部楔形，边缘具多枚刺齿，上面暗绿色，背面浅绿色，无白粉，侧脉13—16对，多分枝，靠近边缘网结，两面网脉显著隆起；近无柄。花6—8朵簇生；花梗长约1.5厘米，红色，无毛；花黄色；萼片2轮，外萼片阔卵形，长约3.5毫米，宽约3毫米，先端微钝，内萼片长圆状椭圆形，长约5毫米，宽约3.5毫米，先端微钝；花瓣倒卵形，长约4.5毫米，宽约3.5毫米，先端圆形，缺裂，基部缢缩呈爪，具2枚长圆形腺体；雄蕊长约4毫米，药隔先端平截；胚珠2枚，无柄。浆果椭圆形至圆球形，长6—8毫米，直径4—5毫米，黑色，顶端具极短宿存花柱，不被白粉；含种子2枚。 花期5—6月，果期9—10月。

产于云南、贵州。生于河谷林缘。海拔1600—1800米。模式标本采自大关成凤山。

87. 江西小檗

Berberis jiangxiensis C. M. Hu in 植物研究 6 (2): 9, 图5, 1986.

87a. 江西小檗（原变种）

var. *jiangxiensis*