

1985.——*B. formosana* Li in Journ. Wash. Acad. Sci. **42** : 41, 1952, non Ahrendt.

常绿矮小灌木。枝细弱，淡灰色，光滑无毛，具棱槽；茎刺三分叉，细弱，长1—1.5厘米，腹面具槽。叶革质，长圆形，长圆状披针形或椭圆形，长1.5—3厘米，宽0.6—1.2厘米，先端急尖，具短细尖头，基部阔楔形，无毛，上面苍白色，中脉微凹陷，背面亮绿色，中脉明显隆起，侧脉5—7对，显著，不被白粉，叶缘平展，每边具3—7刺齿；叶柄短。花2—6朵簇生；花梗纤细，长8—10毫米，光滑无毛；花黄色；小苞片三角状卵形，长约1.5毫米，先端急尖；萼片2轮，外萼片阔卵形或倒卵状椭圆形，长约5毫米，先端急尖，内萼片倒卵状椭圆形或倒卵形，长约5毫米，先端圆形；花瓣倒卵形，长约4毫米，先端缺裂，基部渐狭，具2枚分离腺体；雄蕊长约2.5毫米，药隔先端微延伸，平截；胚珠单生，具柄。浆果椭圆状或卵状，黑色，长4—6毫米，直径约2毫米，顶端无宿存花柱，被白粉。

产于台湾。生于山坡。

98. 贵州小檗

Berberis cavaleriei Lév. in Repert. Sp. Nov. **9** : 454, 1911; Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. **57** : 83, 1961; Chamberlain et C. M. Hu, in Notes Bot. Gand. Edinb. **42** (3): 553, 1985; 云南植物志 **7** : 42, 图版 14, 1—2, 1997.——*B. emilii* Schneid. in Repert. Sp. Nov. **46** : 255, 1939; ——*B. dolichostemon* Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. **57** : 59, 1961. ——*B. praecipua* var. *major* Ahrendt in op. cit. : 43, 1961.——*B. liophylla* var. *conglobata* Ahrendt in op. cit. : 74, 1961.

常绿灌木，高约2米。老枝棕灰色，幼枝棕黄色，具深槽，散生黑色疣点；茎刺三分叉，腹面扁平或具浅槽，长1—2.5厘米。叶革质，椭圆形或长圆状椭圆形，长2.5—6厘米，宽1—1.5厘米，先端钝或近急尖，基部楔形，上面暗绿色，中脉明显凹陷，背面黄绿色，中脉明显隆起，两面侧脉微显，网脉不显，不被白粉，叶缘稍向背面反卷，每边具6—15刺齿；叶柄长1—2.5毫米。花5—20朵簇生；花梗纤细，长8—20毫米；花黄色；小苞片卵形，先端渐尖，长约2.5毫米；萼片2轮，外萼片卵形或狭卵形，长约3毫米，宽约1毫米，先端钝或急尖，内萼片倒卵形或狭倒卵形，长2—4.5毫米，宽1—1.5毫米，先端近急尖；花瓣卵形或倒卵形，长约5.5毫米，宽约2.8毫米，先端锐裂，基部具2枚分离腺体；雄蕊长2.5—4毫米，药隔先端平截；胚珠单生，具短柄。浆果长圆形，黑色，长7—8毫米，直径约4毫米，顶端明显具宿存花柱，不被白粉。花期4—5月，果期7—10月。

产于贵州、云南。生于山坡灌丛、路边或密林中。海拔900—1800米。模式标本可能采自贵州龙里至贵阳之间。

99. 密齿小檗

Berberis aristato-serrulata Hayata Icon. Pl. Formos. **3** : 13. f. 5. 1913; Ahrendt