

1928.——*B. chingii* subsp. *wulingensis* C. M. Hu in 植物研究6(2):8, 图4, 1—6, 1986; syn. nov. — *B. chingii* subsp. *subedentata* C. M. Hu op. cit.: 9, 1986, syn. nov.

常绿灌木，高1—2米。老枝暗灰色，幼枝淡黄色，圆柱形或微具条棱，具黑色疣点；茎刺粗壮，与枝同色，三分叉，长1—2.5厘米。叶薄革质，长圆状倒披针形或长圆状狭椭圆形，长2—8厘米，宽0.8—2.5厘米，先端急尖，基部楔形，上面暗绿色，有时有光泽，中脉明显凹陷，侧脉5—10对微显，背面被白粉，中脉隆起，侧脉不显，两面网脉不显，叶缘平展，中部以上每边具2—10刺齿或偶有全缘，齿间距3—20毫米；叶柄长2—4毫米。花4—14朵簇生；花梗长7—18毫米；花黄色；小苞片三角形；萼片2轮，外萼片椭圆形，长5—5.5毫米，先端纯，内萼片倒卵状长圆形，长约6.5毫米；花瓣倒卵形，长约5.5毫米，宽约3毫米，先端断裂，基部缢缩呈爪，具2枚近靠腺体；雄蕊长约4.5毫米，药隔先端延伸，钝形；胚珠2—3枚。浆果椭圆状或倒卵状椭圆形，长6—8毫米，直径4—5毫米，顶端明显具宿存花柱，被白粉。花期4—5月，果期6—9月。

产于江西、湖南、福建、广东。生于山沟杂木林下、水沟边、山坡灌丛中、石灰岩山坡。海拔250—2000米。模式标本采自江西婺源。

112. 可食小檗

Berberis vinifera Ying 西藏植物志2: 142, 图41, 15, 1985.

常绿灌木，高1—3米。老枝灰黑色，圆柱状，幼枝暗灰色，具条棱，被短柔毛；茎刺三分叉，与枝同色，长4—10毫米。叶革质，椭圆形、宽椭圆形、稀倒卵形，长1.5—4.5厘米，宽6—18毫米，先端圆形，基部宽楔形，上面暗绿色，中脉和侧脉微隆起，背面淡灰褐色，中脉和侧脉明显隆起，不被白粉，两面密网脉明显隆起，叶缘平展，每边中部以上具1—4刺齿，齿间距4—7毫米，偶有全缘；近无柄。花4—20朵簇生或偶见其中数花具极短总梗；胚珠4—5枚。花未见。果梗长7—18毫米；浆果卵球形，长8—10毫米，直径5—7毫米，幼时绿色，熟后紫黑色，具明显宿存花柱，长1—2毫米，被白粉；含种子4—5枚。果期5—7月。

产于西藏。生于山坡灌丛中或杂木林下。海拔2200—2500米。模式标本采自聂拉木。

据记录，本种果可食，酿酒。

本种近似产于印度的 *B. manipurana* Ahrendt, 但本种枝被短柔毛，叶长5厘米以下，果具明显宿存花柱。易于区别。

113. 丛林小檗

Berberis dumicola Schneid. in New Flora & Silva 10: 259, 1938; et in Repert. Sp. Nov. 46: 249, 1939; Ahrendt. in Journ. Linn. Soc. Bot. 57: 69, 1961; Cham-