

berlin et C. M. Hu in Notes Bot. Gard. Edinb. **42** (3): 551, 1985; 云南植物志 **7**: 63, 1997.

常绿灌木，高1—2米。茎圆柱状，幼枝微带红色，老枝淡黄色，光滑无毛，具明显棕黑色疣点；茎刺三分叉，长1—2厘米，腹面扁平或具微槽。叶革质，叶形变化大，通常椭圆形，长5—9.5厘米，宽1.5—2厘米，先端近渐尖或急尖，基部楔形，上面暗黄栗色，中脉明显凹陷，背面棕黄色，中脉明显隆起，不被白粉，两面侧脉和网脉不显著，叶缘平展，每边具20—40刺齿；叶柄长4—5毫米。花5—20朵簇生；花梗长8—15毫米，带红色；花黄色；小苞片卵形，先端钝或近急尖；萼片2轮，外萼片长圆状卵形，长约3毫米，宽约2.5毫米，微带红色，先端钝形，内萼片长圆状倒卵形，长约6毫米，宽约5毫米；花瓣长圆状倒卵形，长约6.5毫米，宽约5毫米，先端圆形、锐裂至缺裂，基部缢缩呈爪，具2枚分离的卵形腺体；雄蕊长约4.5毫米，药隔延伸，先端近突尖；胚珠1—2枚，珠柄与胚珠近等长。浆果椭圆状，紫黑色，长8—9毫米，直径4—5毫米，顶端具明显宿存花柱，被白粉。花期4—5月，果期10月。

产于云南。生于山坡灌丛中、林缘、路边或向阳山石坡。海拔2000—3000米。模式标本采自维西。

114. 假小檗

Berberis fallax Schneid. in Repert. Sp. Nav. **46**: 263, 1939; Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. **57**: 49, 1961; Chamberlain et C. M. Hu in Notes Bot. Gard. Edinb. **42** (3): 543, 1985; 云南植物志 **7**: 65, 图21, 3—9, 1997.

114a. 假小檗 (原变种)

var. *fallax*

常绿灌木，高1—2.5米。老枝棕灰色，幼枝棕黄色，明显具槽棱，无疣点；茎刺细弱，三分叉，长6—20毫米，腹面具槽。叶薄革质，长圆状椭圆形至披针形，长2—6厘米，宽8—16毫米，先端钝尖，具1刺尖，基部楔形，上面暗绿色，有时有光泽，中脉微凹陷，背面淡黄色，中脉明显隆起，不被白粉，两面侧脉微隆起，网脉微显，叶缘平展，每边具7—15刺齿；近无柄。花3—7朵簇生；花梗长1—2厘米，无毛；花黄色；萼片2轮，外萼片卵形，长约4.5毫米，宽约3毫米，先端近急尖，内萼片阔椭圆形，长约6毫米，宽约4毫米；花瓣倒卵形，长约4毫米，宽约2.5毫米，先端微凹，基部缢缩呈爪，具2枚分离腺体；雄蕊长约2.5毫米，药隔延伸，先端凹缺；胚珠4—5枚，近无柄。浆果椭圆形，长约8毫米，直径约5毫米，顶端具极短宿存花柱，不被白粉。花期2—3月，果期9—11月。

产于云南。生于山坡灌丛中或林中。海拔1800—3200米。模式标本采自碧江。

114b. 阔叶假小檗 (变种)

var. *latifolia* C. Y. Wu et S. Y. Bao in 植物研究 **5** (3): 6, 1985; 云南植物志 **7**: