

产于中国，具体地点不详。模式标本是栽培品，种子采于中国，W. Kerr 39 号，栽培于 Wisley 植物园。未见标本，根据原描述：叶硬革质，倒披针形，长达 4.5 厘米；圆锥花序长 3—5 厘米；果被白粉，是一个很清楚的种。因此，按原文献记载转述于此。

209. 刺黄花

Berberis polyantha Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **29** : 302, 1892; Schneid in Sargent, Pl. Wils. **1** : 376, 1913; Ahrendt in Journ. R. Hort. Soc. **79** : 190, Fig. 3, Apr. 1954; et in Journ. Linn. Soc. Bot. **57** : 201, 1961; 中国药用植物志, 8: 图 359, 1965; 中国高等植物图鉴 **1** : 774, 图 1548, 1972; 西藏植物志 **2** : 127, 1985,

半常绿灌木，高一般 1.5—2 米，可达 4.5 米。老枝灰褐色，具槽和稀疏疣点；茎刺通常单生，偶三分叉，长 1—3 厘米。叶革质，长圆状倒卵形或倒卵形，长 0.8—4.5 厘米，宽 0.5—1.7 厘米，先端圆形，基部楔形，上面亮暗绿色，中脉扁平或凹陷，背面淡绿色，不被白粉，中脉隆起，两面网脉细密，显著隆起，叶缘平展，每边具 3—10 刺齿，有时全缘；叶近无柄。圆锥花序具 30—100 朵花，分枝多而斜升，长 6—14 厘米，包括总梗长 0.3—2 厘米，无毛；花梗长 2—4 毫米，无毛；苞片长 1.5—2.5 毫米；花黄色；小苞片三角形，长 1—1.5 毫米；萼片 2 轮，外萼片卵形，长 3.5 毫米，宽约 2 毫米，先端急尖，内萼片倒卵形，长 4.5—6.5 毫米，宽 2.5—3 毫米；花瓣倒卵形，长 3.5—4 毫米，宽约 2 毫米，先端锐裂，裂片急尖，基部缢缩呈爪，具 2 枚分离的长圆形腺体；雄蕊长约 3 毫米，药隔延伸，先端钝形；胚珠 2 枚，近无柄。浆果狭卵形，长 7—8 毫米，直径 3—4 毫米，暗红色或暗红棕色，顶端具长达 1.5 毫米的宿存花柱，被白粉。种子紫色。花期 5—7 月，果期 8—10 月。

产于四川、西藏。生于向阳山坡、灌丛中、路边、林缘、草坡、林中或河谷两岸。海拔 2000—3600 米。模式标本采自四川康定附近。

川西地区民间用作黄连代用品，用根煮水吃去火，或用于洗眼治眼病等。

210. 锡金小檗

Berberis sikkimensis (Schneid.) Ahrendt in Journ. Bot. Lond. **80** (Suppl.): 85, 1942, et in Journ. Linn. Soc. Bot. **57** : 99, 1961; 西藏植物志 **2** : 130, 图 40, 8—14, 1985. —*B. sikkimensis* var. *glabramea* Ahrendt in Journ. Bot. Lond. **80** (Suppl.) 87, 1942; 云南植物志 **7** : 88, 1997, syn. nov. —*B. sikkimensis* var. *baileyi* Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. **57** : 99, 1961. syn. nov.

半常绿灌木，高 1.5—2.5 米。老枝暗灰色，无毛或被疏柔毛，具稀疏疣点，幼枝淡黄色，无毛，具棱槽；茎刺三分叉，长 0.5—2 厘米，淡黄色，腹面具浅槽。叶革质，倒卵形或倒卵状椭圆形，长 1.5—2.7 厘米，宽 5—10 毫米，先端急尖或圆钝，具 1 刺尖头，基部楔形，上面深绿色，微有光泽，中脉扁平，背面黄绿色，初被白粉，后脱落，散生乳突，中脉微隆起，侧脉 2—4 对，两面网脉显著，叶缘平展，全缘或每边具