

1—5 刺齿；具短柄。圆锥花序或总状花序具 3—20 朵花，长 3—5 厘米，包括总梗长 0.5—2 厘米；花梗长 4—8 毫米，光滑无毛；花黄色；小苞片萼片状、黄色，长约 2 毫米，宽约 1.6 毫米，急尖；萼片 2 轮，外萼片卵形，长 3.5—4 毫米，宽 2.5—3 毫米，先端急尖，内萼片阔椭圆形，长 7—8 毫米，宽约 5 毫米；花瓣倒卵形，长约 6 毫米，宽约 4 毫米，先端全缘或波状，基部缢缩呈爪，具 2 枚分离腺体；雄蕊长约 6 毫米，药隔先端延伸，微突尖；胚珠 4 枚。浆果狭卵形，暗红色，长约 1.5 厘米，直径约 4.5 毫米，常微弯曲，顶端具长约 1.5 毫米的宿存花柱，不被白粉。花期 5—6 月，果期 7—8 月。

产于云南、西藏。生于杂木林中、林缘或灌丛中。海拔 2000—3000 米。尼泊尔、锡金、不丹也有分布。模式标本采自锡金。

211. 贡山小檗

Berberis coryi Veitch in Gard. Chron. (3), 52 : 321, 1912; Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. 57 : 207, 1916; 云南植物志 7 : 81, 1997.

半常绿灌木。叶匙形，长 10—25 毫米，宽 8—12 毫米，叶缘全缘，先端微凹，基部楔形，叶背面苍白色。圆锥花序具 7—20 朵花，长 3—5 厘米，有时缩为总状花序或簇生花序；花梗长 4—5 毫米。浆果长圆状球形，长 5—6 毫米，直径 4.5—6 毫米，桔红色，顶端具长约 0.5 毫米的宿存花柱，被白霜。

产于云南。生于悬崖、干燥岩坡或岩堆上。海拔 3000—3300 米。

James Veitch 在 Gard. Chron. (3), 52: 321, 1912 上“发表”新种时，十分简单地记述了“果圆形，被白霜，橘红色；叶常绿，密生于茎，匙形，下面苍白色”，没有述及花序、叶缘、花梗及花柱等，也没有说明标本产地、采集人和模式标本。1961 年 Ahrendt 在 J. Linn. Soc. Bot. 57: 207 上记述了这个种，仍很简单，但指明该种为圆锥花序，有时缩为总状花序或簇生花序；叶全缘；先端微凹。并指定 Forrest 18516 号为模式，然而，此号标本 Forrest 采于 1917—1919 年，较 Veitch “发表”新种时晚 5 到 7 年。由于作者没有见到 Forrest 18516 号标本和 Veitch 发表新种时的凭证标本。特附记于此，有待查考。

212. 万源小檗（新拟）

Berberis metapolyantha Ahrendt, in Journ. Bot. Lond 79 (Suppl.): 75, 1942; et in Journ. Linn. Soc. Bot. 57 : 207, 1961.

半常绿灌木，高 1—2 米。枝被短柔毛，具槽；茎刺三分叉或单生，长 1—1.5 厘米，叶近革质，倒卵形或倒卵状长圆形，长 1.5—2.7 厘米，宽 7—12 毫米，先端圆形，基部楔形，上面暗绿色，背面苍白色，干后棕褐色，两面网脉显著，叶缘通常全缘，稀具 1—3 刺齿；近无柄。圆锥花序具 10—14 朵花，长 3—5 厘米；花梗长 3—5 毫米，被短柔毛；苞片长 2—3 毫米，先端渐尖；花黄色，直径约 6 毫米；小苞片披针形，先